

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena lekova na veliku pakovanje	DDD	Cena lekova na veliku po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0128620	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN	rastvor za injekciju/infužiju	ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	205,60	0,3 g	246,72	-		
0122120	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	prasak za rastvor za infuziju	bodice, 1 po 40 mg	Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.	Portugalija	327,40	20 mg	163,70	-	STAC: Za lečenje akutnog nevansirajućeg krvarenja sa ograničenjem do tri dana (privi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122751	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	prasak za rastvor za injekciju	bodice 1 po 40 mg	Takeda Gmbh	Njemačka	231,90	40 mg	231,90	-	STAC: Za lečenje akutnog nevansirajućeg krvarenja sa ograničenjem do tri dana (privi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122927	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	prasak za rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 40 mg	Krka d.d.	Slovenija	231,90	40 mg	231,90	-	STAC: Za lečenje akutnog nevansirajućeg krvarenja sa ograničenjem do tri dana (privi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122928	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	prasak za rastvor za injekciju	bodica staklena, 5 po 40 mg	Krka d.d.	Slovenija	1.159,40	40 mg	231,88	-	STAC: Za lečenje akutnog nevansirajućeg krvarenja sa ograničenjem do tri dana (privi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122100	A02BC02	pantoprazol	Sandoz	prasak za rastvor za injekciju	1 po 40 mg	Lek Farmaceutika družbe d.d.	Slovenija	231,90	40mg	231,90	-	STAC: Za lečenje akutnog nevansirajućeg krvarenja sa ograničenjem do tri dana (privi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122813	A02BC05	esomeprazol	NEXIUM	prasak za rastvor za injekciju/infužiju	bodica staklena, 10 po 40 mg	AstraZeneca AB	Švedska	4.032,90	30 mg	302,47	-	STAC: Za lečenje akutnog nevansirajućeg krvarenja sa ograničenjem do tri dana (privi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122814	A02BC05	esomeprazol	PEPTIX	prasak za rastvor za injekciju/infužiju	ampula, 10 po 1 ml (1mg/ml)	Hemofarm A.D.	Republika Srbija	4.032,90	30 mg	302,47	-	STAC: Za lečenje akutnog nevansirajućeg krvarenja sa ograničenjem do tri dana (privi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0123138	A03BA01	atropin	ATROPIN SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 100 po 1 ml (1mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	472,70	1,5 mg	70,91	-		
0123137	A03BA01	atropin	ATROPIN SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 1 ml (20 mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	4.726,80	1,5 mg	70,90	-		
0123140	A02BS01	hesicin-butilbromid	EUSCOPAN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (10 mg/2 ml)	Boehringer Ingelheim Espana S.A.	Španija	202,00	60 mg	101,00	-		
0124302	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	rastvor za injekciju	ampula, 20 po 1 ml (2ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	209,50	30 mg	62,85	-		
0124530	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 mg/2 ml	Sloviomed d.o.o.	Republika Srbija	1.367,40	16 mg	1.093,92	-		
0124531	A04AA01	ondansetron	ONDA	rastvor za injekciju	ampula, 4mg/2ml, 1 po 2ml	Vianex S.A.	Grčka	273,50	16 mg	1.094,00	-		
0124533	A04AA01	ondansetron	ONDA	rastvor za injekciju	ampula, 8mg/4ml, 1 po 4ml	Vianex S.A.	Grčka	624,80	16 mg	1.249,20	-		
0124535	A04AA01	ondansetron	ONDANSETRON PEYTON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (4mg/2ml)	Pharmaceuticals Limited, Peckforton Pharmaceuticals Limited, Siedefarma-SOC, Industrial Expansion, Farmaceuticos S.A., UAB Noramedia	Velika Britanija; Velika Britanija; Poljska; Portugalska; Lijevica	1.367,40	16 mg	1.093,92	-		
0124574	A04AA05	palonosetron	ALOXI	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 5 ml (250 mcg/5 ml)	Helios Birex Pharmaceuticals Ltd.; Pharmawiss d.o.o.	Irska; Republika Srbija	5.383,20	0,25 mg	5,383,20	-		
1124588	A04AA55	palonosetron, netupitant	AKYNEZO	kapsula, tvrdla	blistar, 1 po (0,5mg+300mg)	Pharmaceuticals Ltd.	Irska	6.973,90	1 kapsula	6,973,90	-	Prevencija akutne i održane mučnina i povraćanja izazvanih visoko emetogenom antineoplasičnom hemoterapijom na bazi cisplatin (763,7, Y43,3)	STAC
1124587	A04AD12	paregipant	EMEND	kapsula, tvrdla	blistar, 1 po 125 mg, 2 po 30 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandska	5.868,50	95 mg	1.956,17	-		
0127452	A05BA-	omibispasartol	HEPA-MERZ	rastvor za infuziju	10 po 5 g(10 ml)	Merz Pharma GmbH	Njemačka	4.736,80	-	-	-		STAC
3125300	A06AD65	makrogol, natrijum-hlorid, kalijum hlorid, natrijum-Hengenkarbamid, natrijum-kulfat	FORTRANS	prasak za oralni rastvor	kesica, 4 po 74 g (64g+1,62g+0,75g+1,68g +5,7g)	Beaufour Ipsen Industrie	Fранцуска	730,80	-	-	-		STAC: Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i iktografiju.
412930	A07AE06	budesonid	BUENOFAALK	rektalna pena	kontejner pod prtljenjem sa vredicom za doziranje, 14 po 1,2g (2mg/dozira)	Dr. Falk Pharma GmbH	Njemačka	6.629,00	1 doza	473,50	-	Ulcerozni kolits (K51)	
5129473	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	rektalna suspenzija	boca plastična, 7 po 60 ml (75 g/60 ml)	Dr Falk Pharma GmbH	Njemačka	3.314,40	1,5 g	177,56	-	Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.	
5129132	A07EC02	mesalazin	PENTASA	rektalna suspenzija	boca plastična, 7 po 100 ml (75 g/100 ml)	Ferring-Léclive, A.S.	Ceska	1.805,20	1,5 g	386,83	-	Ulcerozni kolits (K51)	
0051750	A11DA01	itamin B1	VITAMIN B1 ALKALOID	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	2.028,70	50 mg	20,29	-		
0052184	A11EA-	vitamin B-kompleks (itamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalijum-pantotenat, cijanokobalamin)	BEVIPLEX	liofilizat za rastvor za injekciju	5 x (40 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 10 mg + 40 mg + 0,64 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	807,30	-	-			
0051645	A11GA01	sakorbinova kiselina	VITAMIN C	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (500 mg/5 ml)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	1.099,00	0,2 g	15,19	-		
0051351	A11HA02	piridolsan (vitamin B6)	BEDOXIN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.040,10	0,16 g	66,57	-		
0050150	A11JA-	retinol, fitomenadion, ergo-kalciferol, tokoferol	VITALIPID N INFANT	koncentrat za emulziju za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mcg/ml)	Fresenius Kabi AB	Švedska	2.929,30	-	-	-	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovani različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpcionu II malnutrijciju (K50). Lek se primenjuje samo kod dece do 11 godina starosti	
0050151	A11JA-	retinol, fitomenadion, ergo-kalciferol, tokoferol	VITALIPID N ADULT	koncentrat za emulziju za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (184,1 mcg/ml + 15 mcg/ml + 0,5 mcg/ml + 0,91 mcg/ml)	Fresenius Kabi AB	Švedska	2.329,80	-	-	-	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovani različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpcionu II malnutrijciju (K50).	
1174015	A16AA-	alfa-oleo-(R)-oleoquinon, kalijumova so, alfa-oleo-leucin, kalijumova so, alfa-oleo-fenilalanin, kalijumova so, alfa-olico-valin, alfa-olico-alanin, alfa-olico-hidroksil-(R,S)-metionin, kalijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, brozin	KETOSTERIL	film tableta	blistar, 100 po 67 mg + 10 mg + 53 mg + 53 mg + 38 mg + 30 mg	Labesoft-Laboratories Almro S.A.	Portugalija	4.706,30	-	-	-	Prevencija i lečenja edeotonija nastalog usled poremeđaja metabolizma preteča u hroničnoj bušoreni insuficijenci uz snimanju unosa sestrelja sastava hrane od 40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa britzom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketostabil tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min.	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062036	B01AB01	heparin	HEPARIN	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5000 iJ./1	Galenika a.d.	Republika Srbija	421,70	10000 iJ.	168,68	-		
0062037	B01AB01	heparin	HEPARIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 25000 iJ./5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	3.094,90	10000 iJ.	123,80	-		
0062039	B01AB01	heparin-natrijum	HEPARIN PANPHARMA	rastvor za injekciju	böćca staklena, 10 po 5 ml (25000 iJ./5 ml)	Penpharma u saradnji sa Rotexmedica GmbH, Nemačka	Francuska	3.094,90	10000 iJ.	123,80	-		
0062161	B01AB02	antitrombin III	ANTITROMBIN III BAXTER	präparat i rastvor za rastvor za infuziju	1 po 10 ml (500 iJ./10 ml)	Baxter AG	Austrija	25.735,10	2100 iJ.	106,087,42	-	1. Profilaksika i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III 2. Profilaksika i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III	
0062162	B01AB02	antitrombin III	ANTITROMBIN III BAXTER	präparat i rastvor za rastvor za infuziju	1 po 20 ml (1000 iJ./20 ml)	Baxter AG	Austrija	51.469,90	2100 iJ.	108,086,79	-	Profilaksika i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III	
0062170	B01AB02	antitrombin III	KYBERNIN P 500	präparat i rastvor za rastvor za infuziju	böćca sa pršljenom i böćca sa restvarećem, 1 po 10 ml (500 iJ./10 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	25.735,10	2100 iJ.	108,087,42	-	1. Profilaksika i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III 2. Profilaksika i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III	
0062163	B01AB02	antitrombin III	ATENATIV 500	präparat i rastvor za rastvor za infuziju	böćca sa pršljenom i böćca sa restvarećem, 1 po 10 ml (500 iJ./ml)	Octapharma AB	Švedska	25.735,10	2100 iJ.	108,087,42	-	Profilaksika i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III	
0062164	B01AB02	antitrombin III	ATENATIV 1000	präparat i rastvor za rastvor za infuziju	böćca sa pršljenom i böćca sa restvarećem, 1 po 20 ml (500 iJ./ml)	Octapharma AB	Švedska	51.469,90	2100 iJ.	108,086,79	-	Profilaksika i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III	
0062210	B01AB04	dalteparin- natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju	nepunjeno injekcioni sprije, 10 po 2500 iJ./0,2 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	1.679,40	2500 iJ.	167,94	-	1. Pre i postoperativna profilaksika tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje trombosa dubokih vena u ambulantnim uslovima da postizanje terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijalista 3. Profilaksika kod bolesnika sa zračajno povećanim rizikom od nastanka venске tromboembolije koji su privremeno immobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih kardiovaskularnih intervencija (PCI/PTCA) 5. Profilaksika veniske tromboembolijske bolesti kod trudnice sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno. Profilaksika ponovljene gubitaka ploda kod trudnice sa prethodnim habitualnim potaćanjima i utvrđenim naslednjem trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062211	B01AB04	dalteparin- natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju	nepunjeno injekcioni sprije, 10 po 5000 iJ./0,2 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	3.081,80	2500 iJ.	154,06	-	1. Pre i postoperativna profilaksika tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje trombosa dubokih vena u ambulantnim uslovima da postizanje terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijalista 3. Profilaksika kod bolesnika sa zračajno povećanim rizikom od nastanka venске tromboembolije koji su privremeno immobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih kardiovaskularnih intervencija (PCI/PTCA) 5. Profilaksika veniske tromboembolijske bolesti kod trudnice sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno. Profilaksika ponovljene gubitaka ploda kod trudnice sa prethodnim habitualnim potaćanjima i utvrđenim naslednjem trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062212	B01AB04	dalteparin- natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula,10 po 10000 iJ./1 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	4.791,50	2500 iJ.	119,79	-	1. Pre i postoperativna profilaksika tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje trombosa dubokih vena u ambulantnim uslovima da postizanje terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijalista 3. Profilaksika kod bolesnika sa zračajno povećanim rizikom od nastanka venске tromboembolije koji su privremeno immobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih kardiovaskularnih intervencija (PCI/PTCA) 5. Profilaksika veniske tromboembolijske bolesti kod trudnice sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno. Profilaksika ponovljene gubitaka ploda kod trudnice sa prethodnim habitualnim potaćanjima i utvrđenim naslednjem trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U isčerpu pacijentima sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI)	
0062205	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom spircu	napunjeno injekcioni spirci sa glicom, 10 po 0,2 ml (2000 iJ./0,2 ml)	Sandoz Weling, Indiano-Chicago Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	2.074,10	2000 iJ.	207,41	-	1. Pre i postoperativna profilaksika tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje trombosa dubokih vena u ambulantnim uslovima da postizanje terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijalista 3. Profilaksika kod bolesnika sa zračajno povećanim rizikom od nastanka venске tromboembolije koji su privremeno immobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih kardiovaskularnih intervencija (PCI/PTCA) 5. Profilaksika veniske tromboembolijske bolesti kod trudnice sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno. Profilaksika ponovljene gubitaka ploda kod trudnice sa prethodnim habitualnim potaćanjima i utvrđenim naslednjem trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U isčerpu pacijentima sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI)	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062206	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom spricu	nапуњен инјекциони сприк са глом, 10 по 0,4 ml (4000 IU./0,4 ml)	Sanofi Winthrop Industrie, Chiron Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	3.811,30	2000-i.j	190,57	-	1. Pre i postoperativna profilaksma tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboga dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu orálnih antikoagulatorasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksma kod bolesnika sa zražajno povećanim rizikom od nastanka veniske tromboembolije koji su prvičeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija). 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksma veniske tromboemboljske bolesti kod trudnice sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja posluptarstva; Profilaksma ponovljenih gubaka ploda kod trudnice sa prethodnim habitualnim pobacanjem i utvrđenim naslednjem trombofilijom ili antiostrofilijim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062207	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom spricu	nапуњен инјекциони сприк са глом, 10 по 0,6 ml (6000 IU./0,6 ml)	Sanofi Winthrop Industrie, Chiron Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	5.015,00	2000-i.j	167,17	-	1. Pre i postoperativna profilaksma tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboga dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu orálnih antikoagulatorasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksma kod bolesnika sa zražajno povećanim rizikom od nastanka veniske tromboembolije koji su prvičeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija). 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksma veniske tromboemboljske bolesti kod trudnice sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja posluptarstva; Profilaksma ponovljenih gubaka ploda kod trudnice sa prethodnim habitualnim pobacanjem i utvrđenim naslednjem trombofilijom ili antiostrofilijim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062208	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom spricu	nапуњен инјекциони сприк са глом, 10 по 0,8 ml (8000 IU./0,8 ml)	Sanofi Winthrop Industrie, Chiron Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	5.696,00	2000-i.j	142,40	-	1. Pre i postoperativna profilaksma tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboga dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu orálnih antikoagulatorasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksma kod bolesnika sa zražajno povećanim rizikom od nastanka veniske tromboembolije koji su prvičeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija). 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksma veniske tromboemboljske bolesti kod trudnice sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja posluptarstva; Profilaksma ponovljenih gubaka ploda kod trudnice sa prethodnim habitualnim pobacanjem i utvrđenim naslednjem trombofilijom ili antiostrofilijim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062300	B01AB06	nadroparin kalciјum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom spricu; 10 po 2850 i.j /0,3ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	1.764,80	2850-i.j	176,46	-	1. Pre i postoperativna profilaksma tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboga dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu orálnih antikoagulatorasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksma kod bolesnika sa zražajno povećanim rizikom od nastanka veniske tromboembolije koji su prvičeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija). 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksma veniske tromboemboljske bolesti kod trudnice sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja posluptarstva; Profilaksma ponovljenih gubaka ploda kod trudnice sa prethodnim habitualnim pobacanjem i utvrđenim naslednjem trombofilijom ili antiostrofilijim sindromom.	
0062400	B01AB06	nadroparin kalciјum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom spricu; 10 po 3800 i.j /0,4ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	1.853,50	2850-i.j	146,51	-	1. Pre i postoperativna profilaksma tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboga dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu orálnih antikoagulatorasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksma kod bolesnika sa zražajno povećanim rizikom od nastanka veniske tromboembolije koji su prvičeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija). 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksma veniske tromboemboljske bolesti kod trudnice sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja posluptarstva; Profilaksma ponovljenih gubaka ploda kod trudnice sa prethodnim habitualnim pobacanjem i utvrđenim naslednjem trombofilijom ili antiostrofilijim sindromom.	
0062302	B01AB06	nadroparin kalciјum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom spricu; 10 po 5700 i.j /0,6ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	2.838,90	2850-i.j	141,95	-	1. Pre i postoperativna profilaksma tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboga dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu orálnih antikoagulatorasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksma kod bolesnika sa zražajno povećanim rizikom od nastanka veniske tromboembolije koji su prvičeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija). 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksma veniske tromboemboljske bolesti kod trudnice sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja posluptarstva; Profilaksma ponovljenih gubaka ploda kod trudnice sa prethodnim habitualnim pobacanjem i utvrđenim naslednjem trombofilijom ili antiostrofilijim sindromom.	
0064130	B01AD02	alteplaza	ACTILYSE	praslak i rastvor za rastvor za injekciju/infuziju	liječilo sa rastvorom, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemacka	47.956,20	0,1 g	65.912,40	-	STAC	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0064060	B01AD11	tenekleplaza	METALYSE	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	lobotikača sa rastvaračem u srupci, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	11.4543,00	40 mg	91.634,40	-	
1069611	B01AE07	dabigatraneteksilat	PRADAXA	kapsula, tvrdla	blistor, 30 po 75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	3.180,20	300 mg	424,03	-	Prevenkcija verske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvalu zamene kuka ili kolena.
1069614	B01AE07	dabigatraneteksilat	PRADAXA	kapsula, tvrdla	blistor, 30 po 110 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	3.148,80	300 mg	286,25	-	Prevenkcija verske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvalu zamene kuka ili kolena.
0062420	B01AX05	fondaparinux-natrijum	ARIXTRA	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju, nispunjen injekcijski sprik, 10 po 2,5mg/0,5 ml	Aspen Notre Dame de Bonneville	Francuska	4.662,70	2,5mg	486,27	-	
1069600	B01AF01	riwareksaban	XARELTO	film tabletta	blistor, 10 po 10 mg	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Pharma AG	Italija; Nemačka	2.138,60	10 mg	213,86	-	Prevenkcija verske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvalu zamene kuka ili kolena.
1068025	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	film tabletta	blistor, 10 po 2,5 mg	Bristol Myers Squibb S.P.R.L	Italija	1.064,70	10mg	425,88	-	Prevenkcija verske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvalu zamene kuka ili kolena.
1068026	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	film tabletta	blistor, 60 po 2,5 mg	Bristol Myers Squibb S.P.R.L	Italija	6.388,20	10mg	425,88	-	Prevenkcija verske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvalu zamene kuka ili kolena.
0065040	B02AC02	traneksamska kiselina	TRANEXAMIC MEDOCHEMIE	rastvor za injekciju/infuziju	ampulja, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)	Medocchemie Ltd. (Ampholyte injectable facility)	Kipar	1.144,50	2 g	457,80	-	1. Lokalna fibrinoliza - krvakotražna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konzacije cerviksa i hirurških procedura / dentálnih elektricitacija kod bolesnika sa hemofiliom;
0050970	B02BAC1	fitonemadijan (vitamin K1)	KONAKION MM	rastvor za injekciju	ampulja, 5 po 10 mg/1 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	232,00	20 mg	92,80	-	2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanim intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna akutnica fibrinolitičkog sistema.
0050974	B02BAC1	fitonemadijan (vitamin K1)	KONAKION MM	rastvor za injekciju	ampulja, 5 po 2 mg/0,2 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	260,00	20 mg	561,80	-	
0067061	B02BC30	fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid	BERIPLAST P Comb-Sel 1ml	pršlak i rastvarač za lepk za trlovo	bodica, 4 po 1 (set 3 ml); (90 mg/ml; + 60 iJ/ml; + 1000 KIU/ml; + 1ml) (1ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	11.223,80	-	-	-	STAC
0067062	B02BC30	fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid	BERIPLAST P Comb-Sel 3ml	pršlak i rastvarač za lepk za trlovo	bodica, 4 po 1 (set 3 ml); (270 mg/3 ml; + 180 iJ/3 ml; + 3000 KIU/3 ml; + 1500 iJ/3 ml; + 17,7mg/3ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	32.922,80	-	-	-	STAC
0066014	B02BD02	humani faktor koagulacije VII	OCTANATE 250	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodica sa pršlakom i bodica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 iJ/ml)	Octapharma - Produktionen m.b.H.; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.	Austrija; Švedska; Francuska	14.668,70	500 iJ	29.337,40	-	
0066012	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	OCTANATE 500	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodica sa pršlakom i bodica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 iJ/ml)	Octapharma - Produktionen m.b.H.; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.	Austrija; Švedska; Francuska	26.009,80	500 iJ	26.009,80	-	
0066013	B02BD02	humani faktor koagulacije VII	OCTANATE 1000	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodica sa pršlakom i bodica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 iJ/ml)	Octapharma - Produktionen m.b.H.; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.	Austrija; Švedska; Francuska	52.019,50	500 iJ	26.009,75	-	
0066610	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofili faktor VII)	BERIATE	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodica sa pršlakom i bodica sa rastvaračem, 1 po 2,5 ml (250 iJ/2,5 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	14.668,70	500 iJ	29.337,40	-	
0066611	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofili faktor VII)	BERIATE	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodica sa pršlakom i bodica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 iJ/5 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	26.009,80	500 iJ	26.009,80	-	
0066612	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofili faktor VII)	BERIATE	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodica sa pršlakom i bodica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 iJ/ml)	ZLB Behring GmbH	Nemačka	52.019,50	500 iJ	26.009,75	-	
0066630	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	HAEMOCTIN SDH	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodica, 1 po 250 iJ (50 iJ/ml + 5ml vode za inj.)	Bioteest Pharma GmbH	Nemačka	14.668,70	500 iJ	29.337,40	-	
0066631	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	HAEMOCTIN SDH	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodica, 1 po 500 iJ (50 iJ/ml + 10ml vode za inj.)	Bioteest Pharma GmbH	Nemačka	26.009,80	500 iJ	26.009,80	-	
0066632	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	HAEMOCTIN SDH	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodica, 1 po 1000 iJ (100 iJ/ml + 10ml vode za inj.)	Bioteest Pharma GmbH	Nemačka	52.019,50	500 iJ	26.009,75	-	
0066907	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	KOATE-DVI	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodica sa pršlakom i bodica sa rastvaračem 1 po 5 ml (250 iJ/5 ml)	Grifols Therapeutics INC	SAD	14.668,70	500 iJ	29.337,40	-	
0066908	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	KOATE-DVI	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodica sa pršlakom i bodica sa rastvaračem 1 po 5 ml (500 iJ/5 ml)	Grifols Therapeutics INC.	SAD	26.009,80	500 iJ	26.009,80	-	
0066906	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	KOATE-DVI	pršlak i rastvarač za rastvor za infuziju	bodica sa pršlakom i bodica sa rastvaračem 1 po 10 ml (500 iJ/10ml)	Grifols Therapeutics INC.	SAD	52.019,50	500 iJ	26.009,75	-	
0066105	B02BD02	humani faktor koagulacije VII	EMOCLOT	pršlak i rastvarač za rastvor za infuziju	bodica sa pršlakom i bodica sa rastvaračem 1 po 10 ml (500 iJ/10ml)	Kedron S.P.A.	Italija	26.009,80	500 iJ	26.009,80	-	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066106	B02BD02	humani faktor koagulacije VII	EMOCLOT	pršak i rastvarač za rastvor za infuziju	bodice sa prškom i bodice sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 U/10ml)	Kedron S.P.A.	Italija	52.019,50	500ij	26.009,75	-		
0066905	B02BD02	oktikog alfa	KOGENATE BAYER	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem (sa biselet priborom) 1 po 2,5 ml (250 U/2,5 ml)	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmaceutska država d.o.o.	Italija; Slovenija	26.009,80	500ij	26.009,80	-		
0066903	B02BD02	oktikog alfa	KOGENATE BAYER	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem (sa biselet priborom) 1 po 2,5 ml (250 U/2,5 ml)	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmaceutska država d.o.o.	Italija; Slovenija	14.668,70	500ij	29.337,40	-		
0066901	B02BD02	oktikog alfa	KOGENATE BAYER	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem (sa biselet priborom) 1 po 2,5 ml (1000 U/2,5 ml)	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmaceutska država d.o.o.	Italija; Slovenija	52.019,50	500ij	26.009,75	-		
0066909	B02BD02	oktikog alfa	RECOMBINATE 250	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i bodice sa rastvaračem, 1 po 10 ml (250 U/10 ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Bečija	14.668,70	500ij	29.337,40	-		
0066910	B02BD02	oktikog alfa	RECOMBINATE 500	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i bodice sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 U/10 ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Bečija	26.009,80	500ij	26.009,80	-		
0066911	B02BD02	oktikog alfa	RECOMBINATE 1000	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i bodice sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 U/10 ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Bečija	52.019,50	500ij	26.009,75	-		
0066918	B02BD02	oktikog alfa	ADVATE	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i bodice sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 U/5ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Bečija	14.668,70	500ij	29.337,40	-		
0066917	B02BD02	oktikog alfa	ADVATE	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i bodice sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 U/5ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Bečija	26.009,80	500ij	26.009,80	-		
0066916	B02BD02	oktikog alfa	ADVATE	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i bodice sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000 U/5ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Bečija	52.019,50	500ij	26.009,75	-		
0066770	B02BD02	morotokog alfa	REFACTO AF	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (250 U/4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	14.668,70	500ij	29.337,40	-		
0066771	B02BD02	morotokog alfa	REFACTO AF	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500 U/4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	26.009,80	500ij	26.009,80	-		
0066772	B02BD02	morotokog alfa	REFACTO AF	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000 U/4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	52.019,50	500ij	26.009,75	-		
0066773	B02BD02	morotokog alfa	REFACTO AF	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (2000 U/4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	107.113,20	500ij	26.778,30	-		
0066180	B02BD02	simotokog alfa	NUWIQ	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem, 1 po 2,5ml (250 U/2,5ml)	Octapharma AB	Švedska	14.668,70	500ij	29.337,40	-		
0066181	B02BD02	simotokog alfa	NUWIQ	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem, 1 po 2,5ml (500 U/2,5ml)	Octapharma AB	Švedska	26.009,80	500ij	26.009,80	-		
0066182	B02BD02	simotokog alfa	NUWIQ	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem, 1 po 2,5ml (1000 U/2,5ml)	Octapharma AB	Švedska	52.019,50	500ij	26.009,75	-		
0066183	B02BD02	simotokog alfa	NUWIQ	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem, 1 po 2,5ml (2000 U/2,5ml)	Octapharma AB	Švedska	107.113,20	500ij	26.778,30	-		
0069001	B02BD02	turotokog alfa	NOVOEIGHT	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem 1 po 4 ml (2000 U/4 ml)	Nova Nordisk A/S	Danska	14.668,70	500ij	29.337,40	-		
0069002	B02BD02	turotokog alfa	NOVOEIGHT	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodice sa prškom i napoljeni injekcioni spric sa rastvaračem 1 po 4 ml (500 U/4 ml)	Nova Nordisk A/S	Danska	26.009,80	500ij	26.009,80	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066003	B02BD02	turotokog alfa	NOVOEIGHT	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i napunjeni injekcioni spric sa rastvaracem 1 po 4 ml (1000 i.j.)	Novo Nordisk A/S	Danska	52.019,50	500 i.j.	26.009,75	-	
0066044	B02BD03	antihinitorski kompleks faktora VIII	FEIBA NF	pršlak i rastvarač za rastvor za infuziju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem i Bayect i Hi-Flow, 1 po 20 ml (500 i.j./20 ml)	Baxter AG	Austrija	50.056,70	10000 i.j.	1.001,134,00	-	Za dokazane inhibitele na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu misljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centru za lečenje hemofilije.
0066007	B02BD04	koagulacioni faktor IX, ljudski	OCTANINE F	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H	Austrija	24.307,60	350 i.j.	17.015,32	-	
0066171	B02BD04	koagulacioni faktor IX, ljudski	IMMUNINE	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 5 ml (800 i.j./5 ml)	Baxter AG	Austrija	27.709,90	350 i.j.	16.164,11	-	
0066501	B02BD04	koagulacioni faktor IX, ljudski	HAEMONINE 500	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 5 ml (100 i.j./ml)	Bioteest Pharma GmbH	Nemačka	24.307,60	350 i.j.	17.015,32	-	
0066500	B02BD04	koagulacioni faktor IX, ljudski	HAEMONINE 1000	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)	Bioteest Pharma GmbH	Nemačka	46.815,20	350 i.j.	17.015,32	-	
0066020	B02BD04	ljudski faktor koagulacije IX	AIMAFIX	pršlak i rastvarač za rastvor za infuziju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	24.307,60	350 i.j.	17.015,32	-	
0066110	B02BD04	nonskog alfa	BENEFIX	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i napunjeni injekcioni spric sa rastvaracem, 1 po 5 ml (250 i.j./ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	12.231,60	350 i.j.	17.124,24	-	
0066111	B02BD04	nonskog alfa	BENEFIX	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i napunjeni injekcioni spric sa rastvaracem, 1 po 5 ml (500 i.j./ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	24.463,20	350 i.j.	17.124,24	-	
0066112	B02BD04	nonskog alfa	BENEFIX	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i napunjeni injekcioni spric sa rastvaracem, 1 po 5 ml (1000 i.j./ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	46.926,30	350 i.j.	17.124,21	-	
0066113	B02BD04	nonskog alfa	BENEFIX	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i napunjeni injekcioni spric sa rastvaracem, 1 po 5 ml (2000 i.j./ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	97.852,70	350 i.j.	17.124,22	-	
0066200	B02BD05	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCF), koagulacioni faktor VIII, ljudski	HAEMATE P 250	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 5 ml (600 i.j./5ml+250 i.j./5ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	19.301,30	7200 i.j.	555,877,44	-	Terapija i profilaksis krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.
0066201	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCF), koagulacioni faktor VIII, ljudski	HAEMATE P 500	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 10 ml (1200 i.j./10ml+500 i.j./10 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	36.602,50	7200 i.j.	555,878,00	-	Terapija i profilaksis krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.
0066202	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCF), koagulacioni faktor VIII, ljudski	HAEMATE P 1000	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 15 ml (2400 i.j./15ml+1000 i.j./15 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	77.204,90	7200 i.j.	555,875,28	-	Terapija i profilaksis krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.
0066210	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCF), ljudski koagulacioni faktor VIII, ljudski	IMMUNATE	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 5 ml (190 i.j./5 ml + 250 i.j./5 ml)	Baxter AG	Austrija	13.368,10	7200 i.j.	385,577,28	-	Terapija i profilaksis krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.
0066212	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCF), ljudski koagulacioni faktor VIII, ljudski	IMMUNATE	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 5 ml (375 i.j./5 ml + 500 i.j./5 ml)	Baxter AG	Austrija	26.776,20	7200 i.j.	385,577,28	-	Terapija i profilaksis krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.
0066211	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCF), ljudski koagulacioni faktor VIII, ljudski	IMMUNATE	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem, 1 po 10 ml (750 i.j./10 ml + 1000 i.j./10 ml)	Baxter AG	Austrija	53.552,50	7200 i.j.	385,578,00	-	Terapija i profilaksis krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.
0066702	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCF), koagulacioni faktor VIII, ljudski	WILATE 500	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem 1 po 5ml (500 i.j./5ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H	Austrija	36.602,50	7200 i.j.	555,878,00	-	Terapija i profilaksis krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.
0066703	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCF), koagulacioni faktor VIII, ljudski	WILATE 1000	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bodčić sa prškom i bodčić sa rastvaracem 1 po 10ml (1000 i.j./10ml + 1000 i.j./10ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H	Austrija	77.204,90	7200 i.j.	555,875,28	-	Terapija i profilaksis krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.
0066704	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, ljudski faktor koagulacije VIII	FANHDI	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodčić sa prškom i napunjeni injekcioni spric sa rastvaracem, 1 po 10 ml (30 i.j. vWF/ml + 25 i.j. FVII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	14.438,70	7200 i.j.	415,834,56	-	Terapija i profilaksis krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066705	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FAN-HDI	pršasaki i rastvarač za rastvor za injekciju	bocica sa pršakom i nagnjeni injekcijski spric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (80 iJ. VWF/ml + 50 iJ. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	28.877,30	7200-j	415,833,12	-	Terapija i profilakska krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066706	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FAN-HDI	pršasaki i rastvarač za rastvor za injekciju	bocica sa pršakom i nagnjeni injekcijski spric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (120 iJ. VWF/ml + 100 iJ. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	57.754,60	7200-j	415,833,12	-	Terapija i profilakska krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066707	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FAN-HDI	pršasaki i rastvarač za rastvor za injekciju	bocica sa pršakom i nagnjeni injekcijski spric sa rastvaračem, 1 po 15 ml (120 iJ. VWF/ml + 100 iJ. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	86.631,90	7200-j	415,833,12	-	Terapija i profilakska krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stičenom deficijencijom faktora VIII. Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066602	B02BD06	eptakog alfa (aktiviran)	NOVOSEVEN	pršasaki i rastvarač za rastvor za injekciju	bocica sa pršakom i rastvaračem 1 po 1 ml (1 mg/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	72.679,70	2500000 iJ.	3.633,985,00	-	Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitory na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovara na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VIII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centru za lečenje hemofilije.	
0066600	B02BD06	eptakog alfa (aktiviran)	NOVOSEVEN	pršasaki i rastvarač za rastvor za injekciju	bocica sa pršakom i nagnjeni injekcijski spric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1mg/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	72.679,70	2500000 iJ.	3.633,985,00	-	Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitory na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovara na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VIII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centru za lečenje hemofilije.	
0066070	B02BX01	etamsilat	DICYNONE	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (250 mg/ 2 ml)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	1.182,10	-	-	-		
0166072	B02BX01	etamsilat	DICYNONE	rastvor za injekciju	tabлета, 30 po 250 mg/ampula, 5 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Rafarm S.A.	Grčka	1.052,20	-	-	-		
0066250	B03AC	gvožđe (ili)-hidroksil-saharid kompleks	FERROVIN	rastvor za infuziju	koncentrat za rastvor za infuziju	5 po 5ml (100mg/5ml)	Saluts Pharma GMBH	Nemacka	3.218,80	0,1 g	643,76	-	STAC
0060251	B03AC02	gvožđe (ili)-hidroksil-saharid kompleks	FERRUM Sandoz	rastvor za infuziju	ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml	Kedron S.P.A.	Italija	3.644,80	-	-	-	STAC	
0051560	B03B03	hidroksokobalamin	CHB 12	rastvor za injekciju	bocica staklena, 1 po 50 ml, 200g/l	Galentika a.d.	Republika Srpska	384,60	20 mog	0,62	-	STAC	
0179315	B05A/01	albumin, humani	HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER	rastvor za infuziju	bocica, 1 po 50 ml (200g/l)	Baxter AG	Austrija	3.644,80	-	-	-	STAC	
0179323	B05A/01	albumin, humani	HUMAN ALBUMIN 20%	rastvor za infuziju	ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml	Kedron S.P.A.	Italija	3.644,80	-	-	-	STAC	
0179046	B05A/01	albumin, humani	LIJUDSKI ALBUMIN 20%	rastvor za infuziju	ampula, 1 po 10 ml 20%	Institut za transfuziju krv Srbije	Republika Srpska	776,80	-	-	-	STAC	
0179048	B05A/01	albumin, humani	LIJUDSKI ALBUMIN 20%	rastvor za infuziju	bocica, 1 po 50 ml (20%)	Institut za transfuziju krv Srbije	Republika Srpska	3.644,80	-	-	-	STAC	
0179190	B05A/01	albumin	HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING	rastvor za infuziju	bocica, 1 po 50 ml (20%)	CSL Behring GmbH	Nemacka	3.644,80	-	-	-	STAC	
0179380	B05A/01	albumin, humani	ALBIOIN 20%	rastvor za infuziju	staklena bocica, 1 po 50 ml (20%)	Biotest Pharma GmbH	Nemacka	3.644,80	-	-	-	STAC	
0179188	B05A/01	albumin, humani	FLEXBUMIN 20%	rastvor za infuziju	kesa, 24 po 50 ml (20%)	Baxter AG	Austrija	87.474,80	-	-	-	STAC	
0179187	B05A/01	albumin, humani	FLEXBUMIN 20%	rastvor za infuziju	kesa, 12 po 100 ml (20%)	Baxter AG	Austrija	87.474,80	-	-	-	STAC	
0179003	B05A/01	albumin, humani	ALBUNORM 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 50ml (200g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemacka	3.644,80	-	-	-	STAC	
0179004	B05A/01	albumin, humani	ALBUNORM 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100ml (200g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemacka	7.289,60	-	-	-	STAC	
0179001	B05A/01	albumin, humani	ALBUNORM 5%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100ml (50g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemacka	1.943,00	-	-	-	STAC	
0179002	B05A/01	albumin, humani	ALBUNORM 5%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250ml (50g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemacka	4.124,70	-	-	-	STAC	

Lista B. Lekovi koji se primjenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0179000	B05AA01	albumin, humani	ALBUMIN 5%	raствор za infuziju	boca staklena, 1 po 500ml (50g/l)	Octapharma Pharmazeutische Produktionsges.M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma	Austrija; Francuska; Švedska; Njemačka;	9.685,60	-	-	-		STAC
0179551	B05AA01	albumin, humani	ALBUTEIN 20%	raствор za infuziju	bocica staklena, 1 po 50 ml (20g/l)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	3.644,80	-	-	-		STAC
0179552	B05AA01	albumin, humani	ALBUTEIN 20%	raствор za infuziju	bocica staklena, 1 po 100 ml (20g/l)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	7.289,60	-	-	-		STAC
0013454	B05AA01	albumin, humani	UMAN ALBUMIN	raствор za infuziju	bocica staklena, 1 po 500ml (200g/L)	Kedron S.P.A.	Italija	3.644,80	-	-	-		STAC
0013453	B05AA01	albumin, humani	UMAN ALBUMIN	raствор za infuziju	bocica staklena, 1 po 100 ml (200g/L)	Kedron S.P.A.	Italija	7.289,60	-	-	-		STAC
0179345	B05AA01	hemokritičkih, natrijum-Nord, kalcijum-Nord, magnezijum-Nord, natrijum-acetat, jabolčna kiselina	HETASORB 6%	raствор za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml (200g/L)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	692,20	-	-	-		STAC
0178355	B05AA07	alamin, arginin, citosin, fensilaminska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, izolin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin	TETRASPAN 6%	raствор за infuziju	boca 1 po 500 ml (4,64 ml + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/l + 0,4 g/l + 13,09 g/l + 6,62 g/l + 1,52 g/l + 2,7 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 9,4 g/l + 0,7 g/l + 10,08 g/l)	B.Braun Medical SA	Švajcarska	6.667,80	-	-	-		STAC
0174030	B05BA01	alamin, arginin, asparaginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, izolin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin	HEPASOL 8%	raствор за infuziju	boca 1 po 500 ml (4,64 ml + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/l + 0,4 g/l + 13,09 g/l + 6,62 g/l + 1,52 g/l + 2,7 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 9,4 g/l + 0,7 g/l + 10,08 g/l)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	590,70	-	-	-		STAC
0174041	B05BA01	alamin, arginin, asparaginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, izolin, metionin, treonin, fenilalanin, alamin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, treozin, taurin, triptofan	VAMINOLACT	raствор за infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (5,3g/l+4,1g/l+4,1g/l+1g/l+7,1g/l+2,1g/l+2,1g/l+3,1g/l+7,1g/l+1,3g/l+1,3g/l+2,7g/l+6g/l+3g/l+1000mg/l+3,6g/l+1,4g/l+500mg/l+3,6g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	11.509,90	-	-	-		STAC
0174036	B05BA01	izoleucin, leucin, valin, izolin, metionin, treonin, fenilalanin, alamin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, treozin, taurin, triptofan	AMINOSOL 15%	raствор за infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	640,00	-	-	-		STAC
0174035	B05BA01	izoleucin, leucin, valin, izolin, metionin, treonin, fenilalanin, alamin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, treozin, taurin, triptofan	AMINOSOL 10%	raствор за infuziju	boca 1 po 500 ml	Hemomont d.o.o.	Crna Gora	422,60	-	-	-		STAC
0174021	B05BA01	izoleucin, leucin, valin, izolin, metionin, treonin, fenilalanin, alamin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, treozin, taurin, triptofan	AMINOVEN 10%	raствор за infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	4.226,00	-	-	-		STAC
0174023	B05BA01	izoleucin, leucin, valin, izolin, metionin, treonin, fenilalanin, alamin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, treozin, taurin, triptofan	AMINOVEN 15%	raствор за infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	6.400,00	-	-	-		STAC
0171110	B05BA02	sojno ulje, glicerol, lećni sjemeni	LIPOVENODES 10% PLR	emulzija za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml (10g/l+2,5g/l+0,6g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	7.745,10	-	-	-		STAC
0171291	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	emulzija za infuziju	plastična kesica, 10 po 100 ml (20%)	Fresenius Kabi AB	Švedska	5.104,20	-	-	-		STAC
0171287	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	emulzija za infuziju	plastična kesica, 1 po 250 ml (20%)	Fresenius Kabi AB	Švedska	1.031,30	-	-	-		STAC
0171289	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	emulzija za infuziju	plastična kesica, 1 po 500 ml (20%)	Fresenius Kabi AB	Švedska	1.364,60	-	-	-		STAC
0171310	B05BA02	ulje soje, rafinirano, trigliceridi, srednje dužine lanaca	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%	emulzija za infuziju	boca staklena, 10 po 100 ml (100g/l + 100 g/l)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	4.898,10	-	-	-		STAC
0171312	B05BA02	ulje soje, rafinirano, trigliceridi, srednje dužine lanaca	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%	emulzija za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml (100 g/l + 100 g/l)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	13.366,20	-	-	-		STAC
0171297	B05BA02	prečišćeno sojno ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, nizje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFLIPID	emulzija za infuziju	boca, 10 po 100ml (62g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	4.898,30	-	-	-		STAC
0171298	B05BA02	prečišćeno sojno ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, nizje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFLIPID	emulzija za infuziju	boca, 10 po 250ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	6.759,80	-	-	-		STAC
0171299	B05BA02	prečišćeno sojno ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, nizje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFLIPID	emulzija za infuziju	boca, 10 po 500ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	13.366,70	-	-	-		STAC
0173220	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBLE 5%	raствор za infuziju	boca, 1 po 500 ml (5%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	66,50	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
017325	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 10%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (10%)	Hemofarm a.d.	Republika Šrojka	62,50	-	-	-		
017336	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 100 ml (50 g/l)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Nemacka; Španija	1.201,80	-	-	-		
017335	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500ml (50 g/L)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical AG; B. Braun Pharmaceuticals S.A.	Nemacka; Španija; Rumunija	664,90	-	-	-		
017337	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000ml (50 g/L)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical AG	Nemacka; Španija	1.350,30	-	-	-		
017330	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10% B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 x 500ml (100g/L)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical AG; B. Braun Pharmaceuticals S.A.	Nemacka; Španija; Rumunija	825,00	-	-	-		
0173301	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10% B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000ml (100g/L)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Nemacka; Španija	1.633,10	-	-	-		
0173900	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESENIUS	rastvor za infuziju	boca staklena, 49 po 100 ml (5%)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	2.944,30	-	-	-		
0173901	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESENIUS	rastvor za infuziju	boca staklena, 20 po 500 ml (5%)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	1.330,00	-	-	-		
0171300	B05BA10	glukoza, alani�, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, trezin, valin, kalijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	5 po 1026 ml (900 kcal)	Fresenius Kab	Austrija	10.470,20	-	-	-	STAC	
0171301	B05BA10	glukoza, alani�, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, trezin, valin, kalijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	4 po 1540 ml (1400 kcal)	Fresenius Kab	Austrija	11.476,80	-	-	-	STAC	
0171306	B05BA10	glukoza, alani�, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, trezin, valin, kalijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	3 po 2568 ml (2300 kcal)	Fresenius Kab	Švedska	17.280,50	-	-	-	STAC	
0171303	B05BA10	glukoza, alani�, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, trezin, valin, kalijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	4 po 1440 ml (1000 kcal)	Fresenius Kab	Austrija	11.371,20	-	-	-	STAC	
0171305	B05BA10	glukoza, alani�, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, trezin, valin, kalijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	3 po 2400 ml (1700 kcal)	Fresenius Kab	Švedska	12.063,00	-	-	-	STAC	
0171121	B05BA10	alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, trezin, valin, kalijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLONOMEL N4-550E	emulzija za infuziju	kosa, 4 po 2000 ml (11,38g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,62g/l + 0,72g/l + 5,18g/l + 2,45g/l + 3,39g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)	Baxter S.A.	Beograda	13.722,40	-	-	-	STAC	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171123	B05B410	izoleucin, leucin, izin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, serin, treonin, triptofan, treonin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glikoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-i sojno ulje, medvjedina	OLICLINOMEL N7-1000E	emulzija za infuziju	kesa 6 po 1000 ml (20,7g + 11,5g + 10,9g + 4,8g + 6g + 7,3g + 5,8g + 4g + 5,6g + 6,8g + 5g + 4,2g + 1,8g + 0,4g + 5,8g + 6,12g + 5,36g + 4,47g + 1,12g + 400g + 0,74g + 200g)	Baxter S.A.	Bosna i Hercegovina	15.978,70	-	-		STAC
0171124	B05B410	izoleucin, leucin, izin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, treonin, natrijum-acetat, natrijum-hidroksikisel, natrijum-acetat, natrijum-hlorid, kalcijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glikoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje duzine lanca, ulje soje	OLICLINOMEL N7-1000E	emulzija za infuziju	kesa 4 po 2000 ml (20,7g + 11,5g + 10,9g + 4,8g + 6g + 7,3g + 5,8g + 4g + 5,6g + 6,8g + 5g + 4,2g + 1,8g + 0,4g + 5,8g + 6,12g + 5,36g + 4,47g + 1,12g + 400g + 0,74g + 200g)	Baxter S.A.	Bosna i Hercegovina	15.661,70	-	-		STAC
0174203	B05B410	izoleucin, leucin, izin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, treonin, natrijum-acetat, natrijum-hidroksikisel, natrijum-acetat, kalcijum-acetat, kalcijum-hlorid, glikoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje duzine lanca, ulje soje	AMINOPLASMALE B BRAUN 10% E	rastvor za infuziju	boca staklena 10 po 500 ml ni 6g, 8,8g, 6,85g, 4,4g, 4,7g, 4,2g, 1,8g, 6,2g, 11,5g, 3g, 10,5g, 1,2g, 5,6g, 7,2g, 5,36g, 5,36g, 0,4g, 0,88g, 0,36g, 0,45g, 0,505g, 3,58g	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	7.521,00	-	-		STAC
0171320	B05B410	izoleucin, leucin, izin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, treonin, natrijum-acetat, natrijum-hidroksikisel, natrijum-acetat, kalcijum-acetat, kalcijum-hlorid, glikoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje duzine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPIID PERI	emulzija za infuziju	kesa 5 po 1250 ml (1,872 g + 2,504 g + 2,272 g + 1,568 g + 2,84 g + 1 - 1,456 g + 0,456 g + 2,08 g + 2,16 g + 1,352 g + 0,516 g + 0,32 g + 1,2 g + 2,8 g + 2,72 g + 2,4 g + 0,84 g + 0,865 g + 0,435 g + 2,354 g + 0,516 g + 0,353 g + 70,4 g + 0,936 g + 5,26 g + 20 g + 20 g)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	13.744,70	-	-		STAC
0171321	B05B410	izoleucin, leucin, izin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksikisel, natrijum-acetat, kalcijum-acetat, kalcijum-hlorid, glikoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje duzine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPIID PERI	emulzija za infuziju	kesa 5 po 1750 ml (1,872 g + 2,504 g + 2,272 g + 1,568 g + 2,808 g + 1 - 1,456 g + 0,456 g + 2,08 g + 2,16 g + 1,352 g + 0,516 g + 0,32 g + 1,2 g + 2,8 g + 2,72 g + 2,4 g + 0,84 g + 0,865 g + 0,435 g + 2,354 g + 0,516 g + 0,353 g + 70,4 g + 0,936 g + 5,26 g + 20 g + 20 g)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	16.061,30	-	-		STAC
0171322	B05B410	izoleucin, leucin, izin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksikisel, natrijum-acetat, kalcijum-acetat, kalcijum-hlorid, glikoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje duzine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPIID PERI	emulzija za infuziju	kesa 5 po 2500 ml (1,872 g + 2,504 g + 2,272 g + 1,568 g + 2,808 g + 1 - 1,456 g + 0,456 g + 2,08 g + 2,16 g + 1,352 g + 0,516 g + 0,32 g + 1,2 g + 2,8 g + 2,72 g + 2,4 g + 0,84 g + 0,865 g + 0,435 g + 2,354 g + 0,516 g + 0,353 g + 70,4 g + 0,936 g + 5,26 g + 20 g + 20 g)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	19.847,30	-	-		STAC
0171323	B05B410	izoleucin, leucin, izin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksikisel, natrijum-acetat, kalcijum-acetat, kalcijum-hlorid, glikoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje duzine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPIID PLUS	emulzija za infuziju	kesa 5 po 1250 ml (2,208 g + 3,008 g + 2,726 g + 1,88 g + 3,368 g + 1,744 g + 0,544 g + 2,496 g + 2,565 g + 1,624 g + 4,056 g + 0,402 g + 1,44 g + 3,368 g + 3,284 g + 2,88 g + 0,761 g + 0,402 g + 0,222 g + 2,747 g + 0,686 g + 0,47 g + 132 g + 1,872 g + 5,264 g + 20 g + 20 g)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	16.559,60	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171324	B05BA10	izoleucin, leucin, izin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanan, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksikiselat, kalijum-hidroksikiselat, magnesijsum-sulfat, kalcijum-hidroksikiselat, kalcijum-hidroksikiselat, glikozat, natrijum-dihidrogenfosfat, cink acetat, trigliceridi, srednje duljine lanaca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PLUS	emulzija za infuziju	kosa, 5 po 1875 ml (2.256 g/l + 3.008 g/l + 2.728 g/l + 1.88 g/l + 3.388 g/l + 1.744 g/l + 0.544 g/l + 1.624 g/l + 2.592 g/l + 1.624 g/l + 4.656 g/l + 1.584 g/l + 1.44 g/l + 3.264 g/l + 3.284 g/l + 0.781 g/l + 0.402 g/l + 0.688 g/l + 0.47 g/l + 132 g/l + 1.872 g/l + 5.264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	19.298,40	-	-	-		STAC
0171325	B05BA10	izoleucin, leucin, izin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanan, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksikiselat, natrijum-hidroksikiselat, natrijum-acetat, kalijum-hidroksikiselat, magnesijsum-sulfat, kalcijum-hidroksikiselat, glikozat, natrijum-dihidrogenfosfat, cink acetat, trigliceridi, srednje duljine lanaca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PLUS	emulzija za infuziju	kosa, 5 po 2500 ml (2.256 g/l + 3.008 g/l + 2.728 g/l + 1.88 g/l + 3.388 g/l + 1.744 g/l + 0.544 g/l + 1.624 g/l + 2.592 g/l + 1.624 g/l + 4.656 g/l + 1.584 g/l + 1.44 g/l + 3.368 g/l + 3.264 g/l + 2.88 g/l + 0.781 g/l + 0.402 g/l + 0.688 g/l + 0.47 g/l + 132 g/l + 1.872 g/l + 5.264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	25.070,30	-	-	-		STAC
0174205	B05BA10	glukoza monohidrat, alanan, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, izin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, valin, kalcijum-hidroksikiselat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnesijsum-sulfat heptahidrat, kalijum-hidrat, natrijum-acetat trinatrijum-chlorat heksahidrat, natrijum-sulfat, sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanaca, predviđeno maslinovo ulje, ribulo ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOKABIVEN	emulzija za infuziju	kosa, 3 po 2450ml (2700kcal) (425g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 1g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2,9g/l + 4,6g/l + 0,56g/l + 4,1g/l + 1,2g/l + 4,4g/l + 3,4g/l + 0,012g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi AB	Svedska	15.821,00	-	-	-		STAC
0174201	B05BA10	glukoza monohidrat, alanan, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, izin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, valin, kalcijum-hidroksikiselat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnesijsum-sulfat heptahidrat, kalijum-hidrat, natrijum-acetat trinatrijum-chlorat heksahidrat, predviđeno sojino ulje, trigliceridi srednje duljine lanaca, predviđeno maslinovo ulje, ribulo ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOKABIVEN	emulzija za infuziju	kosa, 4 po 1477ml (1600kcal) (422g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 1g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2,9g/l + 4,6g/l + 0,56g/l + 4,1g/l + 1,2g/l + 4,4g/l + 3,4g/l + 0,012g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi AB/Fresenius Kabi AB/Fresenius Kabi GmbH	Svedska; Austrija	14.522,10	-	-	-		STAC
0171346	B05BA10	glukoza, alanan, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, izin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, valin, kalcijum-hidroksikiselat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnesijsum-sulfat, kalijum-hidrat, natrijum-acetat, cink acetat, trigliceridi srednje duljine lanaca, predviđeno maslinovo ulje, ribulo ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOKABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	kosa, 4 po 1200ml (1600kcal) (130g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 4g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2,9g/l + 4,6g/l + 0,56g/l + 4,1g/l + 1,2g/l + 4,4g/l + 3,4g/l + 0,012g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi AB	Svedska	10.609,20	-	-	-		STAC
0175260	B05BB01	natrijum-hidrat, kalijum-hidrat, kalcijum-hidrat	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv.)	rastvor za infuziju	1 boco plastilina, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	78,20	-	-	-		
0175315	B05BB01	natrijum-hidrat, kalijum-hidrat, kalcijum-hidrat	RINGEROV RASTVOR B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)	B.Braun Melsungen AG/B.Braun Pharmaceutical s.A.	Nemačka; Rumunija	782,00	-	-	-		
0175316	B05BB01	natrijum-hidrat, kalijum-hidrat, kalcijum-hidrat	RINGEROV RASTVOR B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/L)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	1.544,90	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0175515	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalijum-hlorid	NATRIJUM-HLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringeroval RSIV)	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml (0,6 g/l+0,3 g/l+0,33 g/l)	Hemofarm d.o.o.	Republika Crna Gora	78,20	-	-	-		
0175331	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalijum-hlorid	RINGEROV RASTVOR	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (6,8 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)	Braffé Medical S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Velika Britanija; Belgija	78,20	-	-	-		
0175185	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	77,20	-	-	-		
0175420	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR BAXTER	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)	Braffé Medical S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Velika Britanija; Belgija	77,20	-	-	-		
0175320	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (6 g/L+0,4 g/L+0,32 g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.	Nemacka; Španija; Rumunija	772,00	-	-	-		
0175321	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000 ml (6 g/l+0,4 g/L+0,37g/L+0,24 g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemacka; Španija	1.234,50	-	-	-		
0175322	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0,9% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 50ml (9g/L)	B.Braun Melsungen AG;B.Braun Medical SA; S.C.B. Braus Pharmaceuticals S.A.	Nemacka; Španija; Rumunija	1.377,20	-	-	-		
0175312	B05BB01	natrijum hlorid	NATRIJUM HLORID 0,9% B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 100 ml (9g/l)	B. Braun Melsungen AG; B.Braun Pharmaceuticals S.A.; B.Braun Medical SA	Nemacka; Rumunija; Španija	1.152,00	-	-	-		
0175565	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0,9% B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 250ml (9g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemacka; Španija	524,00	-	-	-		
0175310	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0,9% B BRAUN	rastvor za infuziju	boca, plastična, 10 po 500ml. (9g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.	Nemacka; Španija; Rumunija	711,80	-	-	-		
0175311	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0,9% B BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000ml (9g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A	Nemacka; Španija; Rumunija	1.446,20	-	-	-		
0400430	B05BC01	manitol	MANITOL HF 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250 ml (20%)	Hemofarm d.o.o.	Republika Srpska	323,70	-	-	-		
0400431	B05BC01	manitol	MANITOL HF 10%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml (10%)	Hemofarm d.o.o.	Republika Crna Gora	349,60	-	-	-		
9175213	B05CX10	manitol, sorbitol	ISPIROL	rastvor za ispiranje bešike	kesa, 5 (5,4 g/l + 27 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.401,10	-	-	-		
9175730	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnijejum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu injiciju	plastična kesa 1 po 2000 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,36 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850,10	-	-	-		
9175731	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnijejum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu injiciju	plastična kesa 1 po 2500 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,36 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	978,60	-	-	-		
9175732	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnijejum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu injiciju	plastična kesa 1 po 5000 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,36 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1.356,30	-	-	-		
9175733	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnijejum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu injiciju	plastična kesa 1 po 2500 ml (2,27 % m/v +(22,7 g/l)+5,36 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850,10	-	-	-		
9175734	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnijejum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu injiciju	plastična kesa 1 po 2500 ml (2,27 % m/v +(22,7 g/l)+5,36 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	978,60	-	-	-		
9175735	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnijejum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu injiciju	plastična kesa 1 po 5000 ml (2,27 % m/v +(22,7 g/l)+5,36 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1.356,30	-	-	-		
9175736	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnijejum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu injiciju	plastična kesa 1 po 2500 ml (3,86% m/v +(38,8g/l)+5,36g/l+4,48g/l+0,184g/l+0,051g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850,10	-	-	-		
9175737	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnijejum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu injiciju	plastična kesa 1 po 2500 ml (3,86% m/v +(38,8g/l)+5,36g/l+4,48g/l+0,184g/l+0,051g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	978,60	-	-	-		
9175738	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnijejum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu injiciju	plastična kesa 1 po 2000 ml (3,86% m/v +(38,8g/l)+5,36g/l+4,48g/l+0,184g/l+0,051g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1.359,30	-	-	-		
9175741	B05D...	riodektin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnijejum-hlorid	EXTRANEAL	rastvor za peritonealnu injiciju	plastična kesa 1 po 2000 ml (7,5g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	2.386,80	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9175730	B05DB	tropon, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, izoleucin, leucin, izin, histidin, erginin, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-hlorid	NUTRINEAL PD4	rastvor za peritonealnu injekciju	plastična kesa 1 po 2000 ml (0,3g)+0,27g(+0,57g)+0,64g(+0,51g)+0,951g(+1,393g)+ +0,55g(+0,85g)+0,12g(+0,055g)+0,714g(+1,071g)+ +0,14g(+0,24g)+0,55g(+0,45g)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1.589,40	-	-	-		
9175716	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 1,5% glukozne, 1,25 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 4 po 2000 ml (5,64g(+3,925g)+ +0,183g(+0,1017g)+ +15g)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.161,10	-	-	-		
9175717	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 2,3% glukozne, 1,25 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 4 po 2000 ml (5,64g(+3,925g)+ +0,183g(+0,1017g)+ +22,73g)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.161,10	-	-	-		
9175718	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 4,25% glukozne, 1,25 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 4 po 2000 ml (5,64g(+3,925g)+ +0,183g(+0,1017g)+ +42,5g)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.161,10	-	-	-		
9175743	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 1,5% glukozne, 1,75 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 4 po 2000 ml (5,64g(+3,925g)+0,2573g(+0,1017g)+15g)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.161,10	-	-	-		
9175744	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 2,3% glukozne, 1,75 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 4 po 2000 ml (5,64g(+3,925g)+ +0,2573g(+0,1017g)+ +22,73g)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.161,10	-	-	-		
9175745	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 4,25% glukozne, 1,75 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 4 po 2000 ml (5,64g(+3,925g)+ +0,2573g(+0,1017g)+ +42,5g)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.161,10	-	-	-		
9175702	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 4,25% glukozne, 1,25 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 4 po 2500 ml (5,64g(+3,925g)+0,183g(L)+0,1017g(+42,5g(L))	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.413,40	-	-	-		
9175701	B05DB	zafolin-hlorid, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 2,3% glukozne, 1,25 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 4 po 2500 ml (5,64g(+3,925g)+0,183g(L)+0,1017g(+22,73g(L))	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.413,40	-	-	-		
9175700	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 1,5% glukozne, 1,25 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 4 po 2500 ml (5,64g(+3,925g)+0,183g(L)+0,1017g(+15g(L))	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.413,40	-	-	-		
9175705	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 4,25% glukozne, 1,25 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 2 po 5000 ml (5,64g(+3,925g)+0,183g(L)+0,1017g(+22,73g(L))	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.413,40	-	-	-		
9175704	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 2,3% glukozne, 1,25 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 2 po 5000 ml (5,64g(+3,925g)+0,183g(L)+0,1017g(+22,73g(L))	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.413,40	-	-	-		
9175703	B05DB	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukozna	BALANCE 1,5% glukozne, 1,25 mmol/L kalijuma	rastvor za peritonealnu injekciju	kesa, 2 po 5000ml (5,64g(+3,925g)+0,183g(L)+0,1017g(+15g(L))	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.413,40	-	-	-		
9175760	B05DB	glukozna, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid	PHYSIONEAL 40 glukozna 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	rastvor za peritonealnu injekciju	dovozna plastična kesa, 1 po 2000 ml (3,6g(+5,38g)+0,184g(+0,051g)+2,1g(+1,689g))	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850,10	-	-	-		
9175762	B05DB	glukozna, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid	PHYSIONEAL 40 glukozna 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	rastvor za peritonealnu injekciju	jednostavna plastična kesa, 1 po 2500 ml (3,6g(+5,38g)+0,184g(+0,051g)+2,1g(+1,689g))	Baxter Healthcare S.A.	Irska	973,50	-	-	-		
9175761	B05DB	glukozna, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid	PHYSIONEAL 40 glukozna 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	rastvor za peritonealnu injekciju	dovozna plastična kesa, 1 po 2500 ml (3,6g(+5,38g)+0,184g(+0,051g)+2,1g(+1,689g))	Baxter Healthcare S.A.	Irska	973,50	-	-	-		
9175765	B05DB	glukozna, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid	PHYSIONEAL 40 glukozna 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	rastvor za peritonealnu injekciju	jednostavna plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g(+5,38g)+0,184g(+0,051g)+2,1g(+1,689g))	Baxter Healthcare S.A.	Irska	973,50	-	-	-		
9175763	B05DB	glukozna, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid	PHYSIONEAL 40 glukozna 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	rastvor za peritonealnu injekciju	dovozna plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g(+5,38g)+0,184g(+0,051g)+2,1g(+1,689g))	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850,10	-	-	-		
9175764	B05DB	glukozna, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid	PHYSIONEAL 40 glukozna 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	rastvor za peritonealnu injekciju	dovozna plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g(+5,38g)+0,184g(+0,051g)+2,1g(+1,689g))	Baxter Healthcare S.A.	Irska	973,50	-	-	-		
9175766	B05DB	glukozna, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid	PHYSIONEAL 40 glukozna 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	rastvor za peritonealnu injekciju	dovozna plastična kesa, 1 po 2000 ml (38,6g(+5,38g)+0,184g(+0,051g)+2,1g(+1,689g))	Baxter Healthcare S.A.	Irska	850,10	-	-	-		
0175150	B05XA01	kalijum hlorid FRESENIUS	KALIJUM CHLORID FRESENIUS	konzentrat za rastvor za infuziju	20 po 20 ml (1 mmol/ml AS)	Fresenius Kabi Norge AS	Norveška	898,10	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštiteno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0175333	B05XA01	kalijum-hlorid	KALIJUM HLORID 7,45% B BRAUN	konzentrat za rastvor za infuziju	ampulica staklena; 20 po 20 ml	B.Braun Melsungen	Nemačka	696,10	-	-		
0175335	B05XA01	kalijum-hlorid	KALIJUM HLORID 7,45% B BRAUN	konzentrat za rastvor za infuziju	boca staklena, 20 po 100 ml	B.Braun Melsungen	Nemačka	3.144,60	-	-		
0133110	B05XA02	natrijum hidrogenkarbonat 8,4%	NATRUM BICARBONAT "FREŠENIUS"	konzentrat za rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 100 ml (8,4%)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	3.896,70	-	-		
0175240	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml (0,9%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	71,20	-	-		
0175582	B05XA03	natrijum hlorid	SODIUM CHLORIDE	rastvor za infuziju	boca staklena, 49 po 100 ml (8g)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	2.822,30	-	-		
0175581	B05XA03	natrijum hlorid	SODIUM CHLORIDE	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml (8g)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	71,20	-	-		
0170350	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 100 ml (9 g/l)	Bifffe Medital S.A.; Bifffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Inška	57,60	-	-		
0175351	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 250 ml (9 g/l)	Bifffe Medital S.A.; Bifffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Inška	52,40	-	-		
0175352	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (9 g/l)	Bifffe Medital S.A.; Bifffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Inška	71,20	-	-		
0174050	B05XB02	alanil-glutamin	Dipeptiven	konzentrat za rastvor za infuziju	boca, 10 po 100 ml (20 g/100 ml)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	36.129,40	-	-		STAC
0052720	B05XC01	isamin, ribesalin, nikotinamid, pridolsan, teofilinska kiselina, theofloksikolin, atenokarbokska kiselina, teofilin, teofloksikolin, cijanokobalamin	SOLUVIT N	pradak za rastvor za infuziju	bocica staklena, 10 po 10 (2,5mg+3,6mg+40mg+4mg+1,5mg+100mg+62mcg+9,4mg+5mcg)	Fresenius Kabi AB	Švedska	3.535,70	-	-		STAC
0100255	C01A005	digoksin	SOPHARMA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (0,25mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	511,10	0,25 mg	25,56	-	
0101355	C01B001	umoduron	CORDARONE	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 3 ml (150 mg/3 ml)	Sanofi Winthrop Industrie	Fранцуска	421,30	0,2 g	93,62	-	
0105001	C01CA03	norepinefrin	NOREPINEFRIN MEDIKACION	konzentrat za rastvor za infuziju	ampula, 100 po 10ml (1mg/ml)	Laboratorios Normon S.A.	Španija	29.159,00	6 mg	349,91	-	
0105146	C01CA04	dopamin	DOPAMIN ADMEDA 50	konzentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Haupt Pharma Wulffing GmbH; Nemacka za Admetra Arzneimittel GmbH	Nemačka	522,90	0,5 g	1.045,80	-	
0105401	C01CA07	dobutamin	DOBUTAMIN ACOMEDA 250	konzentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 50 ml (250 mg/50 ml)	Haupt Pharma Wulffing GmbH; Nemacka za Admetra Arzneimittel GmbH	Nemačka	397,20	0,5 g	794,40	-	
0105000	C01CA07	dobutamin	DOBUTAMINE PANPHARMA	konzentrat za rastvor za infuziju	bocica staklena, 10 po 20 ml (250mg/20ml)	Rotomedia GmbH	Nemačka	3.972,00	0,5 g	794,40	-	
0102180	C01DA02	gliceritinitrat (nitroglycerin)	NIKIMI	konzentrat za rastvor za infuziju	ampula, 50 po 1,6 ml (5mg/1,6ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	4.040,90	-	-		
0102183	C01DA02	gliceritinitrat	NITROGLUCERINA BIORINDUSTRIAL I.M.	konzentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)	Laboratorio Iberico Medicinal S PA	Italija	808,20	-	-		
0103290	C02CA05	urepidil	EBRANTIL 25	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 25 mg/5 ml	Takeda GmbH; Takeda Austria GmbH	Nemačka; Austrija	970,70	50 mg	388,28	-	STAC
0103291	C02CA08	urepidil	EBRANTIL 50	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 50 mg/10 ml	Takeda GmbH; Takeda Austria GmbH	Nemačka; Austrija	910,20	50 mg	182,04	-	STAC
0103293	C02CA08	urepidil	URAPIDIL 25 mg i.v. CARINO	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (25mg/5ml)	Haupt Pharma Wulffing GmbH	Nemačka	970,70	50 mg	388,28	-	STAC
0103294	C02CA08	urepidil	URAPIDIL 50 mg i.v. CARINO	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 10 ml (50mg/10ml)	Haupt Pharma Wulffing GmbH	Nemačka	910,20	50 mg	182,04	-	STAC
0400411	C03CA01	furosemid	FUROSEMID SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (10 mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	377,50	40 mg	75,50	-	
0400412	C03CA01	furosemid	LASIX	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 2 ml (20mg/2ml)	Deutschland GmbH; Delpharm Dijon	Nemačka; Francuska	184,00	40 mg	61,33	-	
0400413	C03CA01	furosemid	EDEMID	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (20 mg/2ml)	Salutes Pharma GmbH	Nemačka	188,80	40mg	75,52	-	
0400440	C03CA02	bumetanid	YURINEX	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	111,70	1 mg	22,34	-	
0107497	C07A002	metoprolol	PRESOLOL	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 50 ml (10mg/50 ml)	Bayer Pharma AG	Nemačka	387,40	0,15 g	2,324,40	-	
0402102	C08CA06	nimedipin	NIMOTOP S	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 50 ml (10mg/50 ml)	Sopharma Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH	Nemačka	937,40	50 mg	4.687,00	-	STAC. Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
0402668	C08CA06	nimedipin	NIMODIPIN 10 mg i.v. CARINO	rastvor za infuziju	ampula, 10 po 2 ml (5 mg/2 ml)	Aalkoloid a.d.	Makedonija	937,40	50 mg	4.687,00	-	STAC. Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
0402721	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (5 mg/2 ml)			336,60	0,24 g	1.615,68	-	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Drvava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103462	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tabletta	blistar, 28 po 7,5 mg	A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Italija	351,30	30 mg	50,19	-	1. Esencijalna hipertenzija: Lek je indikovan u terapiji blage do umjerene esencijalne hipertenzije. 2. Akutni infarkt miokarda: Lek je indikovan u terapiji koja je započeta u prvih 24 sata kod pacijenta sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombofilsku terapiju.	
4156150	C08AG02	povidon jed	POVIDON JOD HF	rstvor za kožu	boca plastična, 1 po 500 ml (10%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	388,70	-	-	-		
4156475	C08AG02	povidon	JODOKOMP	rstvor za kožu	boca plastična, 1 po 100 ml (10 %)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	93,70	-	-	-		
4156474	C08AG02	povidon	JODOKOMP	rstvor za kožu	boca plastična, 1 po 500 ml (10 %)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	389,70	-	-	-		
4156473	C08AG02	povidon	JODOKOMP	rstvor za kožu	kontejner plastični, 1 po 500 ml (10%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	3,897,60	-	-	-		
4156472	C08AG02	povidon	JODOKOMP	pena za kožu	boca plastična, 1 po 100 ml (7,5%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	93,70	-	-	-		
4156471	C08AG02	povidon	JODOKOMP	pena za kožu	boca plastična, 1 po 500 ml (7,5%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	3,897,60	-	-	-		
4156470	C08AG02	povidon	JODOKOMP	pena za kožu	kontejner plastični, 1 po 500 ml (7,5%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	3,897,60	-	-	-		
0141132	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN RIN	injeckija	50 po 0,1 mg/ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	599,60	0,2 mg	23,98	-		
0141135	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN RIN	injeckija	50 po 0,2 mg/ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,206,10	0,2 mg	24,16	-		
4143125	G02AD02	dinoproston (PGE2)	PREPIDIL GEL	endocervikalni gel	1 po 3 g (0,5 mg/3g)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Bečija	1.996,10	0,5 mg	332,88	-		STAC
6143120	G02AD02	dinoproston (PGE2)	PROSTIN EZ	vaginalna tabletta	4 po 3 mg	Sanice NV	Bečija	3.532,50	0,5 mg	147,19	-		STAC
0143043	G02AD04	karboprost (PGM15)	PROSTIN 15M	rstvor za injekciju	1 po 0,25 mg/ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Bečija	1.727,30	2,5 mg	17.273,00	-		STAC
0348619	G03BA03	testosteron DEPO	TESTOSTERON DEPO	rstvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.068,30	18 mg	15,35	-		
0048486	G03DA03	hidroksiprogesteron DEPO	PROGESTERON DEPO	rstvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	985,50	10 mg	7,85	-		
4137040	G03DA04	progesteron	CRINONE	vaginalni gel	8%, aplikator, 15 po 1,125 g	Central Pharma (Contract Packing) LTD	Velika Britanija	3.853,40	90 mg	257,23	-	1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutselne faze (N97). 2. U toku invrto oplođnje (N97).	
0344066	G03GA02	menotrofin	MENOPUR	pršački i rastvarač za rstvor za injekciju	10 boćica po (75 i.j.) sa 10 amp. po 1 ml rastvarač	Ferring GmbH	Nemacka	17.761,90	75 i.j.	1.776,19	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0344087	G03GA02	menotrofin	MENOPUR	pršački i rastvarač za rstvor za injekciju	boca sa pršačkom i napunjeni injekcijski spric za rastvaračem, 1 po 1ml (500 i.j.)	Ferring-Lediva, A.S.	Ceska	15.908,20	75 i.j.	1.988,53	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0344400	G03GA02	menotrofin	MERIONAL	pršački i rastvarač za rstvor za injekciju	liobocićsa sa rastvaračem u ampułi, 1 po 1ml (75 i.j. i LH)	IBSA Institut Biochimique S.A.	Švajcarska	1.778,20	75 i.j.	1.778,20	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0344412	G03GA04	urofolitropin	POSTIMON	pršački i rastvarač za rstvor za injekciju	liobocićsa sa rastvaračem u ampułi, 1 po 1 ml (75 i.j./mg)	IBSA Institut Biochimique S.A.	Švajcarska	1.246,30	75 i.j.	1.246,30	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0344250	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F	pršački i rastvarač za rstvor za injekciju	boca sa pršačkom i napunjeni injekcijski spric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	2.660,70	75 i.j.	2.660,70	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene); 2. Infertilitet u ženi utražen sa hromičnom anovulacijom u sindromu polikističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klonifen cijtrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0344251	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 300	rstvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (300 i.j./0,5 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	11.013,50	75 i.j.	2.753,38	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene); 2. Infertilitet u ženi utražen sa hromičnom anovulacijom u sindromu polikističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klonifen cijtrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0344252	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 450	rstvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,75 ml (450 i.j./0,75 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	16.417,80	75 i.j.	2.736,32	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene); 2. Infertilitet u ženi utražen sa hromičnom anovulacijom u sindromu polikističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klonifen cijtrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0344253	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 900	rstvor za injekciju, u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	32.501,40	75 i.j.	2.733,45	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene); 2. Infertilitet u ženi utražen sa hromičnom anovulacijom u sindromu polikističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klonifen cijtrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0344001	G03GA05	folitropin alfa	BEMFOLA	rstvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,25 ml (150 i.j./0,25 ml)	Finox Biotech AG; Gedeon Richter PLC	Lichtenštajn; Mađarska	4.330,60	75 i.j.	2.165,30	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene); 2. Infertilitet u ženi utražen sa hromičnom anovulacijom u sindromu polikističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klonifen cijtrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0344002	G03GA05	folitropin alfa	BEMFOLA	rstvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,375 ml (225 i.j./0,375 ml)	Finox Biotech AG; Gedeon Richter PLC	Lichtenštajn; Mađarska	6.482,80	75 i.j.	2.160,93	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene); 2. Infertilitet u ženi utražen sa hromičnom anovulacijom u sindromu polikističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klonifen cijtrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0344000	G03GA05	folitropin alfa	BEMFOLA	rstvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,125 ml (75 i.j./0,125 ml)	Finox Biotech AG; Gedeon Richter PLC	Lichtenštajn; Mađarska	2.144,60	75 i.j.	2.144,60	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštocene); 2. Infertilitet u ženi utražen sa hromičnom anovulacijom u sindromu polikističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klonifen cijtrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Učestvovanje osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044230	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 0,36 ml (300 iJ/0,36ml)	Organon Ireland Limited	Irска	10.872,40	75 iJ	2.718,10	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu polikistnih ovaryjuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i kloneni citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koji obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044231	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 0,72 ml (600 iJ/0,72ml)	Organon Ireland Limited	Irска	22.699,20	75 iJ	2.837,40	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu polikistnih ovaryjuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i kloneni citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koji obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044232	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,08 ml (900 iJ/1,08ml)	Organon Ireland Limited	Irска	32.390,80	75 iJ	2.899,23	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamus ili pituitarna oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu polikistnih ovaryjuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i kloneni citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koji obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044270	G03GA08	horilogadotropin alfa	OVITRELLE	rastvor za injekciju u paru sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (250mcg/0,5ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	2.895,10	0,25mg	2.895,10	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044289	G03GA08	horilogadotropin alfa	OVITRELLE	rastvor za injekciju u paru sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (250 mcg/0,5ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	2.895,10	0,25mg	2.895,10	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044405	G03GA08	korifolitropin alfa	ELONVA	rastvor za injekciju u naspunjenom injekcionom spircu	naspunjeni injekcioni spirci, 1 po 0,5 ml (250mcg/0,5ml)	N.V.Organon	Holandija	52.529,10	0,15mg	52.529,10	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044406	G03GA09	korifolitropin alfa	ELONVA	rastvor za injekciju u naspunjenom injekcionom spircu	naspunjeni injekcioni spirci, 1 po 100mcg/0,5ml	N.V.Organon	Holandija	49.028,80	0,15mg	72.043,20	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044256	G03GA30	folitropin alfa, lutropin alfa	PERGOVERIS	praktik i rastvarač za rastvor za injekciju	ampula, 100 po 1 ml (1 iJ/ml)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	3.710,60	15 iJ	55,86	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0140150	H01CB02	oktrotid		SYNTHETIC	rastvor za injekciju								STAC
0049190	H01CB02	oktrotid	SANDOSTATIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 1 ml (0,1 mg/ml)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	1.765,60	0,7 mg	2.471,84	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26; 9; D1-D13; 9, D37-D-37,9). 2. Akromegalija (C05; 2; E22; 0). 3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (85;0). 4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86; 2; K86; 3; K86; 8; K86; 9).	Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049195	H01CB02	oktrotid	SANDOSTATIN LAR	praktik i rastvarač za suspenziju za injekciju	bocica sa pršljenom i naspunjeni injekcioni spirci sa rastvaračem, 1 po 20 mg/2 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	55.917,10	0,7 mg	3.914,20	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26; 9; D1-D13; 9, D37-D-37,9). 2. Akromegalija (C05; 2; E22; 0).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049196	H01CB02	oktrotid	SANDOSTATIN LAR	praktik i rastvarač za suspenziju za injekciju	bocica sa pršljenom i naspunjeni injekcioni spirci sa rastvaračem, 1 po 20 mg/2 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	96.365,30	0,7 mg	3.373,49	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26; 9; D1-D13; 9, D37-D-37,9). 2. Akromegalija (C05; 2; E22; 0).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049197	H01CB02	oktrotid	SANDOSTATIN LAR	praktik i rastvarač za suspenziju za injekciju	bocica sa pršljenom i naspunjeni injekcioni spirci sa rastvaračem, 1 po 30 mg/2 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	125.243,80	0,7 mg	2.822,36	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26; 9; D1-D13; 9, D37-D-37,9). 2. Akromegalija (C05; 2; E22; 0).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049191	H01CB02	oktrotid	OCTREOTIDE BIRNBOIM L.I.M.	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1 ml (0,1mg/ml)	Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A.	Italija	3.531,20	0,7 mg	2.471,84	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26; 9; D1-D13; 9, D37-D-37,9). 2. Akromegalija (C05; 2; E22; 0). 3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (85;0). 4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86; 2; K86; 3; K86; 8; K86; 9).	Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049231	H01CB03	Ianreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju u rastvaračem i naspunjenom injekcionom spircu	naspunjeni injekcioni spirci, 1 po 20 mg	Ipse Pharma Biotech	Francuska	76.912,50	3 mg	3.945,63	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C02-C45; C47-C80; D00-D16; 9; D24; D26; D32; 9; D34-D44; 9; E05; 8; E22; 4; E27; Q55;Q-0;Q55;9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049232	H01CB03	Ianreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju u rastvaračem i naspunjenom injekcionom spircu	naspunjeni injekcioni spirci, 1 po 50 mg	Ipse Pharma Biotech	Francuska	85.171,40	3 mg	2.839,05	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C02-C45; C47-C80; D00-D16; 9; D24; D26; D32; 9; D34-D44; 9; E05; 8; E22; 4; E27; Q55;Q-0;Q55;9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049233	H01CB03	Ianreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju u rastvaračem i naspunjenom injekcionom spircu	naspunjeni injekcioni spirci, 1 po 120 mg	Ipse Pharma Biotech	Francuska	115.757,90	3 mg	2.893,95	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C02-C45; C47-C80; D00-D16; 9; D24; D26; D32; 9; D34-D44; 9; E05; 8; E22; 4; E27; Q55;Q-0;Q55;9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.
0049220	H01CC01	ganirelix	ORGALUTRAN	rastvor za injekciju u naspunjenom injekcionom spircu	naspunjeni injekcioni spirci, 1 po 20 mg (0,25mg/0,5ml)	Organon Ireland Limited	Irска	3.423,70	0,25mg	3.423,70	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044260	H01CC02	cetrotide	CETROTIDE	praktik i rastvarač za rastvor za injekciju	bocica sa pršljenom i naspunjeni injekcioni spirci, 1 po 1ml (0,25mg/ml)	Merck KGaA	Nemačka	3.893,80	0,25mg	3.893,80	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0047266	H02AB01	betametazon	DIPROPHOS	suspensija za injekciju	ampulja, 5 po 1 ml (7 mg/ml)	Schering-Plough Labo NV	Beograda	1.458,30	0,4 mg	18,67	-		
0047140	H02AB02	deksametazon	DEXASON	rastvor za injekciju	ampulja, 25 po 1 ml (4 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.111,80	1,5 mg	18,67	-		
0047145	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	rastvor za injekciju	ampulja, 3 po 2 ml (8mg/2ml)	Merck KGaA	Nemačka	264,50	1,5 mg	16,53	-		
0047220	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD SOLU	praktik i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	ložobica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 7,5 ml (500 mg/7,5 ml)	Hemoferm a.d.	Republika Srbija	670,50	20 mg	26,82	-		
0047218	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD SOLU	suspensija za injekciju	bocica 10 po 1 ml (40 mg/1 ml)	Hemoferm a.d.	Republika Srbija	1.518,90	20 mg	50,63	-		
0047212	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD DEPO	suspensija za injekciju	bocica 10 po 1 ml (40 mg/1 ml)	Hemoferm a.d.	Republika Srbija	990,60	20 mg	49,03	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0050141	H05BX02	parikalcitrol	REXTOL	rastvor za injekciju	ampula, 1 po 1 ml (5mcg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	1,161.90	2 mcg	472.76	-	Sekundarni hiperparatreoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitrol, vezivni fosfat), hipokalcemski dijalizi rastvor i dijeta slična fosforom) sa unerentim hiperparatreoidizmom koji imaju trajno povšen PTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 mjeseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoekstomija) ili imaju negativativno visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatinom bubregom i sekundarnim hiperparatreoidizmom. 3.Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurenčnim sekundarnim hiperparatreoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0050143	H05BX02	parikalcitrol	REXTOL	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (5mcg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	5,909.50	2 mcg	472.76	-	Sekundarni hiperparatreoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitrol, vezivni fosfat), hipokalcemski dijalizi rastvor i dijeta slična fosforom) sa unerentim hiperparatreoidizmom koji imaju trajno povšen PTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 mjeseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoekstomija) ili imaju negativativno visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatinom bubregom i sekundarnim hiperparatreoidizmom. 3.Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurenčnim sekundarnim hiperparatreoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0050142	H05BX02	parikalcitrol	REXTOL	rastvor za injekciju	bodica, 1 po 1 ml (5mcg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	1,161.90	2 mcg	472.76	-	Sekundarni hiperparatreoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitrol, vezivni fosfat), hipokalcemski dijalizi rastvor i dijeta slična fosforom) sa unerentim hiperparatreoidizmom koji imaju trajno povšen PTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 mjeseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoekstomija) ili imaju negativativno visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatinom bubregom i sekundarnim hiperparatreoidizmom. 3.Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurenčnim sekundarnim hiperparatreoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0050144	H05BX02	parikalcitrol	REXTOL	rastvor za injekciju	bodica, 5 po 1 ml (5mcg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	5,909.50	2 mcg	472.76	-	Sekundarni hiperparatreoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitrol, vezivni fosfat), hipokalcemski dijalizi rastvor i dijeta slična fosforom) sa unerentim hiperparatreoidizmom koji imaju trajno povšen PTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 mjeseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoekstomija) ili imaju negativativno visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatinom bubregom i sekundarnim hiperparatreoidizmom. 3.Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurenčnim sekundarnim hiperparatreoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
1050014	H05BX02	parikalcitrol	REXTOL	kapsula, meka	blist., 26 po 1 mcg	Rafarm SA; GAP SA	Grčka, Grčka	5,302.00	2 mcg	378.71	-	Sekundarni hiperparatreoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitrol, vezivni fosfat), hipokalcemski dijalizi rastvor i dijeta slična fosforom) sa unerentim hiperparatreoidizmom koji imaju trajno povšen PTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 mjeseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoekstomija) ili imaju negativativno visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatinom bubregom i sekundarnim hiperparatreoidizmom. 3.Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurenčnim sekundarnim hiperparatreoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
1050017	H05BX02	parikalcitrol	REXTOL	kapsula, meka	blist., 26 po 2 mcg	Rafarm SA; GAP SA	Grčka; Grčka	10,603.90	2 mcg	378.71	-	Sekundarni hiperparatreoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitrol, vezivni fosfat), hipokalcemski dijalizi rastvor i dijeta slična fosforom) sa unerentim hiperparatreoidizmom koji imaju trajno povšen PTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 mjeseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje(paratireoekstomija) ili imaju negativativno visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2.Bolesnika sa transplatinom bubregom i sekundarnim hiperparatreoidizmom. 3.Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurenčnim sekundarnim hiperparatreoidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0026781	J01AA12	bezpenicilin	TVGACIL	pršak za rastvor za infuziju	bodica, 10 po 50 mg	Pharmaducate; Wyeth Leutarie S.r.l.	Velika Britanija, Italija	54,349.60	0,1 g	10,689.92	-		**
0021106	J01CA01	ampicilin	PAMECIL	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory B)	Kipar	397.60	2 g	79.52	-		
0021109	J01CA01	ampicilin	PAMECIL	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 100 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory B)	Kipar	3,975.50	2 g	79.51	-		
0021940	J01CA01	ampicilin	AMPICILLIN ATB 1000 mg	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica, 100 po 1000 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	3,975.50	2 g	79.51	-		
0020017	J01CE01	benzipepcilin	PANPENI G SODIUM	pršak za rastvor za injekciju	bodica abelviro, 50 po 0,6 g (1.000.000 I.U.)	Panpharma	Francuska	3,751.90	3,6 g	450.23	-		
0020056	J01CE30	benzipepcilin, prokainbenzipepcilin	PANCILLIN	pršak za suspenziju za injekciju	bodica, 50 po 600000 i.u. (800000i.u+ 20000i.u)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2,541.80	600000 i.u.	508.32	-		
0021565	J01CR02	ampoksiklin, klavulanska kiseline	AMOKSIKLAV	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	5 po (1000 mg+ 200 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	934.50	3 g	560.70	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0021650	J01CR02	amikacin, klavulanska kiselina	MEDOCCLAV	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 5 po 1,2 g (1000 mg; 200 mg)	Medohemie Ltd (Factory B)	Kipar	904,50	3 g	560,70	-	STAC
0021651	J01CR02	amikacin, klavulanska kiselina	AMOXIP PLUS 1,2g	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	1,2g (1000mg+200mg)	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	9.344,80	3g	560,69	-	STAC
0021995	J01CR05	piperacilin, tazobaktam	PIPTAZ	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 12 po 12 g (4 g + 0,5g)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5.657,20	14 g	1.620,85	-	**
0021996	J01CR05	piperacilin, tazobaktam	TAZOCIN	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica, 12 po 4 g (4 g + 0,5g)	Wyeth Lederle G.R.L.	Italija	5.557,20	14 g	1.620,85	-	**
0321961	J01DB04	cefazolin	GALECEF	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica, 50 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	5.154,00	3 g	309,24	-	
0321962	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 50 po 1g	Galenika a.d.	Republika Srbija	5.154,00	3 g	309,24	-	
0321039	J01DB04	cefazolin	PRIMACEPH	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	50 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5.154,00	3 g	309,24	-	
0321629	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN-MIP	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica, 10 po 2 g	Chephassar Chem-Pharm.	Nemačka	1.601,80	3 g	240,27	-	
0321654	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN-PHARMA NOVA	pršak za rastvor za injekciju	bodica staklena, 5 po 1 g	P.JSC SIC "Borschchivskiy CPP"	Ukrajina	515,40	3 g	309,24	-	
0321027	J01DC02	cefuksim	ZINACEF	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 750 mg	GloboSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	90,40	3 g	361,60	-	
0321028	J01DC02	cefuksim	ZINACEF	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 1500 mg	GloboSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	139,00	3 g	278,00	-	
0321026	J01DC02	cefuksim	CEFUROKSIM	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 1500 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	139,00	3 g	278,00	-	
0321024	J01DC02	cefuksim	CEFUROKSIM	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 750 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	90,40	3 g	361,60	-	
0321404	J01DC02	cefuksim	DICEF	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 50 po 1500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	6.949,50	3 g	277,98	-	
0321682	J01DC02	cefuksim	CEFUROXIM-MIP	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 750 mg	Chephassar Chem-Pharm.	Nemačka	903,80	3 g	361,52	-	
0321683	J01DC02	cefuksim	CEFUROXIM-MIP	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 1500 mg/50 ml	Chephassar Chem-Pharm.	Nemačka	1.389,90	3 g	277,98	-	
0321684	J01DC02	cefuksim	CEFUROXIM-MIP	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 1500 mg/100 ml	Chephassar Chem-Pharm.	Nemačka	1.389,90	3 g	277,98	-	
0321955	J01DC02	cefuksim	CEFUROXIM MEDOCHEMIE	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 750 mg	Medohemie Ltd (Factory C)	Kipar	903,80	3 g	361,52	-	
0321674	J01DC02	cefuksim	CEFUROXIM MEDOCHEMIE	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 1500 mg	Medohemie Ltd (Factory C)	Kipar	1.389,90	3 g	277,98	-	
0321666	J01DC02	cefuksim	CEFUXOUME	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 750 mg	Labeefit - Laboratorios Almro S.A.	Portugalija	903,80	3 g	361,52	-	
0321667	J01DC02	cefuksim	CEFUROXIME	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 1500 mg	Labeefit - Laboratorios Almro S.A.	Portugalija	1.369,90	3 g	277,98	-	
0321963	J01DC01	cefotaksim	CEFOTAXIM MEDOCHEMIE	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 1 g	Medohemie Ltd (Factory C)	Kipar	1.726,00	4 g	690,40	-	STAC
0321964	J01DC01	cefotaksim	CEFOTAXIM MEDOCHEMIE	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 100 po 1 g	Medohemie Ltd (Factory C)	Kipar	17.260,00	4 g	690,40	-	STAC
0321977	J01DC01	cefotaksim	CEFOTAXIM-MIP	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 1 g	Chempak Chem-Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	1.726,00	4 g	690,40	-	STAC
0321976	J01DC01	cefotaksim	CEFOTAXIM-MIP	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 2 g	Chempak Chem-Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	3.836,50	4 g	767,30	-	STAC
0321600	J01DC02	ceftazidim	FORCAS	pršak za rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 1000 mg	GloboSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	311,70	4 g	1.246,60	-	STAC
0321601	J01DC02	ceftazidim	FORCAS	pršak za rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 500 mg	GloboSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	165,30	4 g	1.322,40	-	STAC
0321023	J01DC02	ceftazidim	CEFTAZIDIM	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	311,70	4 g	1.246,80	-	STAC
0321603	J01DC02	ceftazidim	CEFTAZIDIM SANDOZ	pršak za rastvor za injekciju	1 po 500 mg	Sandoz GmbH	Austrija	165,30	4 g	1.322,40	-	STAC
0321602	J01DC02	ceftazidim	CEFTAZIDIM SANDOZ	pršak za rastvor za injekciju	1 po 1 g	Sandoz GmbH	Austrija	311,70	4 g	1.246,80	-	STAC
0321707	J01DC02	ceftazidim	TIZACEF	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 50 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	15.564,80	4 g	1.246,78	-	STAC
0321758	J01DC04	ceftriaxon	AZARAN	pršak za rastvor za injekciju	bodica, 50 po 1000 mg	Hemoform a.d.	Republika Srbija	5.903,80	2 g	236,15	-	STAC**
0321329	J01DC04	ceftriaxon	LONGACEPH	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.180,80	2 g	236,16	-	STAC **
0321653	J01DC04	ceftriaxon	LENDACIN	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica, 10 po 1 g	Sandoz GmbH	Austrija	1.160,80	2 g	236,16	-	STAC **
0321997	J01DC04	ceftriaxon	CEFTRIAXON-MIP	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 1 g	Chephassar Chem-Pharm.	Nemačka	1.180,80	2 g	236,16	-	STAC **
0321999	J01DC04	ceftriaxon	CEFTRIAXON-MIP	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 10 po 2 g	Chephassar Chem-Pharm.	Nemačka	4.774,80	2 g	477,46	-	STAC **
0321968	J01DC04	ceftriaxon	CEFTRIAXON PHARMA NOVA	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 5 po 1 g	P.JSC SIC "Borschchivskiy CPP"	Ukrajina	590,40	2 g	236,16	-	STAC **
0321978	J01DC04	ceftriaxon	CEFTRIAKSON	pršak i rastvor za rastvor za injekciju	bodica sa preškom i ampolu sa rastvaračem, 1 po 2ml. (500mg/2ml)	Mitrim S.r.l.	Italija	66,30	2g	273,20	-	STAC **
0321979	J01DC04	ceftriaxon	CEFTRIAKSON	pršak i rastvor za rastvor za injekciju	bodica sa preškom i ampolu sa rastvaračem, 1 po 3,5ml. (1g/3,5ml.)	Mitrim S.r.l.	Italija	118,10	2 g	236,20	-	STAC **
0321914	J01DE01	cefepim	MAXICEF	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 1000 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	511,80	2 g	1.023,60	-	STAC
0321630	J01DE01	cefepim	CEFIM	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica, 1 po 1000 mg	Hemoform a.d.	Republika Srbija	511,80	2 g	1.023,60	-	STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321915	J01DE01	cefeplim	CEFEPLIM KABI	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 1 po 1 g	Labeplal - Laboratorios Almirio S.A.	Portugalija	511,80	2 g	1.023,60	-		STAC
0029754	J01DH02	meropenem	MEROCID	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 10 po 1000 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	6.552,10	2 g	1.310,42	-		..
0029755	J01DH02	meropenem	ITANEM	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 10 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	3.230,80	2 g	1.292,32	-		..
0029756	J01DH02	meropenem	ITANEM	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 10 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	6.552,10	2 g	1.310,42	-		..
0029752	J01DH02	meropenem	MEROPENEM SANDOZ	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bocića, 10 po 500 mg	Sandoz GmbH	Austrija	3.230,80	2 g	1.292,32	-		..
0029764	J01DH02	meropenem	MEROPENEM SANDOZ	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	podica, 10 po 1000 mg	Sandoz GmbH	Austrija	6.552,10	2 g	1.310,42	-		..
0029701	J01DH02	meropenem	ARCHIFAR	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 10 po 500 mg	Medichemica Ltd (Factory A)	Kipar	3.230,80	2 g	1.292,32	-		..
0029700	J01DH02	meropenem	ARCHIFAR	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 10 po 1 g	Medichemica Ltd (Factory C)	Kipar	6.552,10	2 g	1.310,42	-		..
0029760	J01DH03	ertapenem natrijum	INVANZ	pršak za koncentrat za rastvor za infuziju	bocića, 1 po 1 g	Laboratories Mevac Sharp & Dohme - Chibret	Francuska	5.015,40	1 g	5.015,40	-		STAC
0029507	J01DH51	imipenem, cilastatin	MIPECID	pršak za rastvor za infuziju	bocića staklena, 10 po 1 g (500 mg + 500 mg)	Pharmawes d.o.o.	Republika Srbija	5.115,90	2 g	2.048,36	-		..
0026601	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM Roche	konzentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 5 ml (400 mg/5 ml+80 mg/5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	2.734,80	1,92 g	1.093,92	-		
0325484	J01FA10	aztreomicin	HEMOMYCIN	pršak za rastvor za infuziju	bocića, 1 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	415,10	0,5 g	415,10	-		STAC
0325476	J01FA10	aztreomicin	SUMAMED	pršak za rastvor za infuziju	bocića staklena, 5 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	2.075,40	0,5 g	415,08	-		STAC
0326041	J01FF01	klindamicin	KLINDAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (150 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.325,50	1,8 g	795,30	-		STAC
0326223	J01FF01	klindamicin	CLUNDAMYCIN-MP	rastvor za injekciju	bedic, 10 po 5 ml (500 mg/ml)	Chephasair Chemi Pharm.	Njemačka	948,80	1,8 g	569,28	-		STAC
0326225	J01FF01	klindamicin	CLUDACIN BA FREE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 1 po 4 ml (150mg/ml)	Vienox S.A. - Plant A'	Crkva	189,80	1,8g	569,40	-		STAC
0326226	J01FF01	klindamicin	CLIDACIN BA FREE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 4 ml (150mg/ml)	Vienox S.A. - Plant A'	Crkva	948,80	1,8g	569,28	-		STAC
7024615	J01GB01	tobramicin	BRAMITOB	rastvor za raspravljanje	kontajner jednodozinski, 56 po 4 ml (300mg/4ml)	Chiesi Farmaceutici SPA	Italija, Italija	205.955,50	0,3g	5.877,79	-	Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom <i>Pseudomonas aeruginosa</i> kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na teritorijalom nivou zdravstvene zaštite
0024552	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (80 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	397,30	0,24 g	119,19	-		
0024553	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	596,00	0,24 g	119,20	-		
0024580	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN HF	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)	Hemofarm AD Vrsac	Republika Srbija	397,30	0,24 g	119,19	-		
0024582	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN HF	rastvor za injekciju	10 po 2 ml (120 mg/2 ml)	Hemofarm AD Vrsac	Republika Srbija	596,00	0,24 g	119,20	-		
0024604	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN B BRAUN	rastvor za infuziju	10 po 20 ml (2 ml x 10 ml)	B Braun Medical S.A.	Španija	6.105,50	240 mg	305,28	-		
0024605	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN B BRAUN	rastvor za infuziju	10 po 20 ml (2 ml x 10 ml)	B Braun Medical S.A.	Španija	7.430,00	240 mg	247,67	-		
0024333	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1ml (40mg/ml)	Krka, Tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	139,70	0,24g	83,82	-		
0024332	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2ml (80mg/2ml)	Krka, Tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	397,30	0,24g	119,19	-		
0024331	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 5 ml (120 mg/5 ml)	Krka, Tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	596,00	0,24g	119,20	-		
0024282	J01GB06	amikacin	AMIKACIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 100 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	629,40	1 g	629,40	-		STAC
0024283	J01GB06	amikacin	AMIKACIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 500 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.808,10	1 g	361,62	-		STAC
0024633	J01GB06	amikacin	AMINOCIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 50 po 2 ml (500 mg/2 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	9.040,50	1 g	361,62	-		STAC
0329412	J01MA02	ciproflokacin	MAROCEN	konzentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 100 mg/1 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	987,00	0,5 g	987,00	-		STAC
0329403	J01MA02	ciproflokacin	CITERAL	konzentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 10 ml (100 mg/10 ml)	Allerion d.o.o.	Beograd: Alkaloid a.d Skopje	987,00	0,5 g	987,00	-		STAC
0329001	J01MA02	ciproflokacin	CIPROFLOXACIN	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)	S.C. Infomed Fluids S.R.L.	Rumunija	4.386,40	0,5 g	1.098,60	-		STAC
0329004	J01MA02	ciproflokacin	CIPROFLOXACIN	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 200 ml (2 mg/ml)	S.C. Infomed Fluids S.R.L.	Rumunija	8.772,60	0,5 g	1.096,58	-		STAC
0329081	J01MA12	levoflokacin	LEVOMAX	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 100 ml (500 mg/100 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	10.515,40	0,5 g	1.051,54	-		STAC
0329200	J01MA12	levoflokacin	ALVOLAMID	rastvor za infuziju	bocića, 10 po 100 ml (5 mg/ml)	Alveogen Pharma d.o.o.	Rp. Republika Srpska; Grčka; Grčka; Španija	10.515,40	0,5 g	1.051,54	-		STAC
0329070	J01MA12	levoflokacin	LEVALOK	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100 ml (5mg/ml)	Krka tovarna Zdravil d.d.; Anfam Hellas S.A.; Pharmathen S.A.	Slovenija; Grčka; Grčka	1.051,50	0,5g	1.051,50	-		STAC
0329201	J01MA12	levoflokacin	LEVOFLOXACIN INNVENTA	rastvor za infuziju	bocića plastika, 1 po 100 ml (500 mg/100ml)	Cooper S.A.	Grčka	1.051,50	0,5 g	1.051,50	-		STAC
0326501	J01MA14	moksiflokacin	ELFONIS	rastvor za infuziju	bocića, 1 po 250ml (400mg/250ml)	Hemofarm A.D.	Republika Srbija	946,40	0,4g	946,40	-		STAC
0326502	J01MA14	moksiflokacin	MCKSIFLOKSCAIN PHARMAS	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	946,40	0,4 g	946,40	-		STAC
0329006	J01MA14	moksiflokacin	MOLOXIN	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)	Krka d.d., Novo Medo Test Pharma GmbH	Stevensija; Njemačka	946,40	0,4 g	946,40	-		STAC
029790	J01XA01	vancomicina	VANCOMYCIN-MP	pršak za rastvor za infuziju	bocića staklena, 5 po 500 mg	Chephasair Chem. Pharms	Njemačka	1.194,00	2 g	955,20	-		..

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0029791	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN-MIP	pršak za rastvor za infuziju	bocića staklena, 5 po 1000 mg	Cephaever Chem. Pharm.	Njemačka	2.924,50	2 g	1.169,80	-		..
0029795	J01XA01	vankomicin	EDCIN	injekcija	1 po 500 mg								..
0029796	J01XA01	vankomicin	EDCIN	injekcija	1 po 1 g	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	238,80	2 g	955,20	-		..
0029797	J01XA01	vankomicin	VOKIN	pršak za rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 500 mg	Vanex S.A.-Plant C	Grčka	238,80	2 g	955,20	-		..
0029797	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN RIEMSER	pršak za rastvor za infuziju	bocića staklena, 5 po 1000 mg	Riemser Arzneimittel AG	Njemačka	2.924,50	2 g	1.169,80	-		..
0029798	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN RIEMSER	pršak za rastvor za infuziju	bocića staklena, 5 po 500 mg	Riemser Arzneimittel AG	Njemačka	1.194,00	2 g	955,20	-		..
0029801	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCINE ALVOGEN	pršak za rastvor za infuziju	bocića, 1 po 500 mg	Xellia Pharmaceuticals Aps	Danska	238,80	2 g	955,20	-		..
0029800	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCINE ALVOGEN	pršak za rastvor za infuziju	bocića, 1 po 1000 mg	Xellia Pharmaceuticals Aps	Danska	564,90	2 g	1.169,80	-		..
0029802	J01XA01	vankomicin	VOXIN	pršak za rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 1 g	Vianex S.A.	Grčka	564,90	2 g	1.169,80	-		..
0029750	J01XA02	telkoplerin	TARGOCID	pršak / rastvor za rastvor za injekciju/infuziju	bocića sa prškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (200 mg/3 ml)	Sanofi S.P.A.	Italija	2.073,70	0,4 g	4.147,40	-		..
0029761	J01XA02	telkoplerin	TARCOCID	pršak / rastvor za rastvor za injekciju/infuziju	bocića sa prškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (400 mg/3 ml)	Sanofi S.P.A.	Italija	3.930,50	0,4 g	3.930,50	-		..
0029787	J01XB01	kolsiflometat-natrijum	COLISTIN Alvogen	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	10 po 1000000j	Alvogen Pharma d.o.o. Xellia Pharmaceuticals Aps	Republika Srpska; Srbija;	7.050,00	9000000j	6.381,00	-		..
7029789	J01XB01	kolsiflometat-natrijum	COLOBREATHÉ	pršak za inhalaciju, tvrdi kapsula	pojedinačne doze, 56 po 1625mg/1625ml	Forest-Tosara Ltd.; Penn Pharmaceutical Services Limited	Irsko; Velika Britanija	100.587,50	3000000 j	3.241,27	-	Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom <i>Pseudomonas aeruginosa</i> kod pacijenata sa cističnom fibrozom (CF).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0029801	J01XD01	metronidazel	ORVAGIL	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100 ml (500 mg/100 ml)	Galenika d.d.	SRBIJA	137,20	1,5 g	411,60	-		STAC
0029784	J01XD01	metronidazel	METRONIDAZOLE B. BRAUN	boca plastična, rastvor za infuziju	20 po 100 ml (500 mg/100 ml)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Njemačka; Španija	2.744,00	1,5 g	411,60	-		STAC
0029785	J01XD01	metronidazel	METRONIDAZOL	rastvor za infuziju	bocića staklena, 10 po 100 ml (500mg/100ml)	S.M. Pharmaceuticals S.R.L.	Italija	1.372,00	1,5 g	411,60	-		STAC
1029050	J01XX08	linezolid	ZENIX	film tabletta	blistер, 10 po 800 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srpska	25.972,10	1,2 g	5.194,42	-		..
0029690	J01XX08	linezolid	ZENIX	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Hemofarm a.d	Republika Srpska	938,10	1,2 g	5.628,60	-		..
0029691	J01XX08	linezolid	ZENIX	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 300 ml (2 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srpska	2.532,60	1,2 g	5.065,20	-		..
1029052	J01XX08	linezolid	ZYVOXID	film tabletta	blistер, 10 po 600 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Njemačka	25.972,10	1,2 g	5.194,42	-		..
0029693	J01XX08	linezolid	ZYVOXID	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 300 ml (2mg/ml)	Presentatiab Norge AS	Norveška	25.326,00	1,2 g	5.065,20	-		..
0327494	J02AA01	amfotericin B	AMBISOME	pršak za koncentrat za disperziju za infuziju	bocića staklena, 10 po 50 mg	Gilead Sciences INC.; Gilead Sciences Ireland UC	SAD; Irsko	159.605,20	35 mg	11.172,38	-		.. STAC
0327312	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	rastvor za infuziju	1 po 100 ml (2 mg/ml)	Pfizer PGM	Francuska	552,40	0,2 g	552,40	-		STAC
0327357	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Republika Srpska	552,40	0,2 g	552,40	-		STAC	
0327001	J02AC01	flukonazol	FLUCONAZOLE B. BRAUN	rastvor za infuziju	kontajner plastični, 10 po 100 ml (2mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	5.524,00	0,2 g	552,40	-		STAC
0327000	J02AC01	flukonazol	FLUCONAZOLE B. BRAUN	rastvor za infuziju	kontajner plastični, 10 po 200 ml (2mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	11.862,60	0,2 g	593,13	-		STAC
0327003	J02AC01	flukonazol	DIFLUZOL	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100ml (2mg/ml)	Balkans d.o.o. Novi Beograd	Republika Srpska	552,40	0,2 g	552,40	-		STAC
1327402	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrdi	blistер, 10 po 100mg	Slatimed d.o.o.	Republika Srpska	701,30	0,2 g	140,26	-		STAC
1327403	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrdi	blistер, 5 po 100 mg	Slatimed d.o.o.	Republika Srpska	350,70	0,2 g	140,26	-		STAC
0327334	J02AC03	vorikonazol	VFEND	pršak za rastvor za infuziju	1 po 200 mg	Pfizer PGM	Francuska	5.897,90	0,4 g	11.795,80	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna glijivna infekcija dokazana histološki ili kolagenizirajući relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puntata, kultura sestice), pod uslovom da u ustanovi postoji infektiološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje.
1327530	J02AC03	vorikonazol	VFEND	film tabletta	blistер, 10 po 50 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Njemačka	3.557,30	0,4 g	2.845,84	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna glijivna infekcija dokazana histološki ili kolagenizirajući relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puntata, kultura sestice), pod uslovom da u ustanovi postoji infektiološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje.
1327532	J02AC03	vorikonazol	VFEND	film tabletta	blistер, 10 po 200 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Njemačka	14.165,30	0,4 g	2.833,06	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna glijivna infekcija dokazana histološki ili kolagenizirajući relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puntata, kultura sestice), pod uslovom da u ustanovi postoji infektiološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327533	J02AC03	vorikorazol	ADEMOLA	pršak za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 200 mg	Hemofarm d.d. Vršac	Republika Srbija	5.897,90	0,4g	11.795,80	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
0327536	J02AC03	vorikorazol	VORAMOL	pršak za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 200 mg	Avogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka; Grčka	5.897,90	0,4 g	11.795,80	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
1327551	J02AC03	vorikorazol	VORAMOL	film tableta	blistер, 14 po 50 mg	Avogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	4.980,20	0,4 g	2.845,83	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
1327552	J02AC03	vorikorazol	VORAMOL	film tableta	blistер, 14 po 200 mg	Avogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	19.831,40	0,4 g	2.833,06	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
0327553	J02AC03	vorikorazol	VORIKONAZOL PLIWA	pršak za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 200 mg	Plive Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	5.897,90	0,4 g	11.795,80	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
1327553	J02AC03	vorikorazol	VORAMOL	film tableta	blistер, 14 po 50 mg	Avogen Pharma d.o.o.; Pharmathen Internationale SA; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka; Grčka	4.980,20	0,4 g	2.845,83	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
0327554	J02AC03	vorikorazol	VORIKONAZOL PHARMAS	pršak za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 200 mg	Anfam Hellas S.A.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Grčka; Grčka; Grčka	5.897,90	0,4 g	11.795,80	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
3327555	J02AC04	posakorazol	NOXAFL	oralna suspenzija	bodica staklena, 1 po 105 ml (40mg/ml)	Schering Plough	Franckija	69.388,00	500 mg	13.218,67	-	Profilaksija invazivnih glijinastih infekcija kod pacijenata primenoma natičnih ćelija hemopojeze koji primaju visoke doze imunosupresivne terapije, zbog reakcije protiv primenice (graft versus host disease) i kod kojih postoji veliki rizik da će razviti invazivnu glijinastu infekciju (294).	STAC: Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.
0327556	J02AX04	kaspofungin	CANCIDAS	pršak za rastvor za infuziju	1 po 50 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	29.073,00	50 mg	29.073,00	-		**: U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
0327561	J02AX04	kaspofungin	CANCIDAS	pršak za koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 70 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	36.964,00	50 mg	26.403,07	-		**: U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
0327565	J02AX04	kaspofungin	DALVOCANS	pršak za koncentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 50 mg	Avogen Pharma d.o.o.; Pharmathen SA	Republika Srbija; Grčka	23.073,80	50 mg	23.073,80	-		**: U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
0327564	J02AX04	kaspofungin	DALVOCANS	pršak za koncentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 70 mg	Avogen Pharma d.o.o.; Pharmathen SA	Republika Srbija; Grčka	34.865,60	50 mg	24.775,43	-		**: U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
0327566	J02AX04	kaspofungin	KASPOFUNGIN PHARMAS	pršak za koncentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 50 mg	Pharmaxoid Healthcare Ltd.; Galenicum Health; SL; SAG Manufacturing; S.L.U.	Malta; Španija; Španija	23.073,80	50 mg	23.073,80	-		**: U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
0327567	J02AX04	kaspofungin	KASPOFUNGIN PHARMAS	pršak za koncentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 70 mg	Pharmaxoid Healthcare Ltd.; Galenicum Health; SL; SAG Manufacturing; S.L.U.	Malta; Španija; Španija	34.865,60	50 mg	24.775,43	-		**: U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
0327568	J02AX05	mikafungin-natrijum	MYCAMINE	pršak za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 50mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	22.571,50	0,1g	45.143,00	-	1. Letanje invazivnih kandidaza. 2. Profilaksija Candida infekcija kod pacijenata podvrgnutih alogenoj transplantaciji natičnih ćelija.	Za indikaciju pod tačkom 1. – „U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje
0327569	J02AX05	mikafungin-natrijum	MYCAMINE	pršak za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 50mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	22.571,50	0,1g	45.143,00	-		Za indikaciju pod tačkom 2. – „U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zastite (samo ako je invazivna glijinasta infekcija dokazana histološki ili izložnjicom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog puncikata, kultura asčit), pod uslovom da u ustanovi postoji infektoloska služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započelo lečenje

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327563	J02AX05	mikafungin-natrijum	MYCAMINE	pršak za rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	43.095,10	0,1g	43.095,10	-	Lečenje invazivnih kandidoze.	** Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite te se može primijeniti samo ako je ustanova gledajući interese otkazane histolezi ili zlostavljen iz relevantnog uzroka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tekućini, kultura pleuračnog plućnog puntata, kultura saschi), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološki smještaj ili infekcijska kluba ili klinički farmakolog. Ili na osnovu mišljenja lečićeorne zdravstvene ustanove a za nastavak lečenja koje je u njoj započeto.
0327500	J02AX06	anidulafungin	ECALTA	pršak za konzentrat za rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100mg	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	40.047,20	0,1g	40.047,20	-	Lečenje invazivnih kandidoze.	** U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna glijinčica inficira dozaračnu histolezi ili zlostavljen iz relevantnog uzroka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tekućini, kultura pleuračnog plućnog puntata, kultura saschi), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološki smještaj ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja lečićeorne zdravstvene ustanove a kojoj je započeto lečenje.
0326270	J05AB01	aciklovir	ZOVIRAX	pršak za rastvor za infuziju	bocića, 5 po 250 mg	GloboSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	2.741,80	4g	8.773,76	-		**
0326260	J05AB05	ganciklovir	CYMEVENE	pršak za rastvor za infuziju	1 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Svjetska	3.455,20	0,5g	3.455,20	-		**
1328610	J05AB14	valganciklovir	VALCYTE	film tabletta	bocića, 50 po 450mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Svjetska	76.642,70	900mg	2.821,42	-	Prevenција CMV bolesti kod CMV - negativnih pacijenata koji su primili transplantantski solidni organ od CMV - pozitivnog donatora (294)	STAC: Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.
0328650	J05AX07	enfuvirtid	FUZEON	pršak i rastvor za rastvor za injekciju	bocića sa pršakom i bocića sa rastvorenim, 60 po 2 ml (90 mg/ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Svjetska	166.895,00	0,18 g	5.563,17	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugi lečeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genetske rezistencije pokazuju da će kombinacija od tri antiretrovirusna lekova može sastaviti sone uz upotrebu Peptida T-20.
001C200	J06AA03	antiserum protiv zmijskog otvora (konjski)	VIEKVIN	rastvor za injekciju	bocića staklena, 1 po 5 ml	"Torfak"	Republika Srpska	7.489,80	-	-	-		Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013553	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMANORM	rastvor za injekciju	bocića staklena, 1 po 10ml (195mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	8.884,90	-	-	-		Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013554	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMANORM	rastvor za injekciju	bocića staklena, 10 po 10ml (165mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	86.549,00	-	-	-		Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013555	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMANORM	rastvor za injekciju	bocića staklena, 1 po 20ml (165mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	17.769,90	-	-	-		Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013551	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMANORM	rastvor za injekciju	bocića staklena, 10 po 20ml (165mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	177.699,40	-	-	-		Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013510	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	OCTAGAM	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktions m.b.H. Octapharma S.A.S.; Octapharma AB	Austrija; Francuska; Švedska	19.016,10	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013511	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	OCTAGAM	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktions m.b.H. Octapharma S.A.S.; Octapharma AB	Austrija; Francuska; Švedska	40.309,80	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013602	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Bioket Pharma GmbH	Nemačka	19.016,10	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013600	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Bioket Pharma GmbH	Nemačka	40.309,80	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013601	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)	Bioket Pharma GmbH	Nemačka	80.537,30	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013505	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100 ml (10%)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	80.480,50	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013507	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 50 ml (10%)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	40.245,30	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013506	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 25 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Svjetska	20.122,60	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013606	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Svjetska	40.245,30	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013607	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Svjetska	80.490,50	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013609	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)	Bioket Pharma GmbH	Nemačka	7.335,20	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekarski specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
001335	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 10 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	4.039,30	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001336	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	19.016,10	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001337	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	40.309,80	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001338	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	80.537,30	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001339	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 400 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	161.074,50	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001340	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 10% DIF	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	40.245,30	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001341	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 10% DIF	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	80.490,50	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001342	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 10% DIF	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 200 ml (100 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	160.981,10	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001343	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 20ml (50mg/ml)	Kedron S.P.A.	Italija	7.335,20	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001344	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 50ml (50mg/ml)	Kedron S.P.A.	Italija	19.016,10	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001345	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 100ml (50mg/ml)	Kedron S.P.A.	Italija	40.309,80	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001346	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 200ml (50mg/ml)	Kedron S.P.A.	Italija	80.537,30	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001347	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IQYMUNE	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 50 ml (100mg/ml)	LFB Biomedicaments	Francuska	40.245,30	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001348	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IQYMUNE	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 100 ml (100mg/ml)	LFB Biomedicaments	Francuska	80.490,50	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001349	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	OCTAGAM	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)	Octapharma Pharmazeutika Productiones, M.B.H. Octapharma AB	Austrija, Švedska	7.335,20	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001350	J06BA02	anti-D (RhD) imunoglobulin, humani	OCTAGAM	rstvor za infuziju	bocica sa pršljačom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (300mcg/2ml)	Kedron S.P.A.	Italija	4.307,80	-	-	-		STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
001351	J06BS01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	RHESONATIV	rstvor za injekciju	ampula, 1 po 2 ml (625 µl /ml)	Octapharma AB	Švedska	5.404,30	-	-	-		STAC
001352	J06BS01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	RHOPHYLAC 300	rstvor za injekciju u napunjenoj injekcijskoj sprici	napunjeno injekcijskoj spric, 1 po 2 ml (300 mcg/2 ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	5.439,00	-	-	-		STAC
001353	J06BS01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	IMMUNORHO	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bocica sa pršljačom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (300mcg/2ml)	Kedron S.P.A.	Italija	4.307,80	-	-	-		STAC
001354	J06BS02	tetanus imunoglobulin, humani	TETAGAM P	rstvor za injekciju u napunjenoj injekcijskoj sprici	napunjeno injekcijskoj spric, 1 po 1 ml (250 µl /ml)	CSL Behring GmbH	Nemacka	1.007,80	-	-	-		STAC
001355	J06BS02	tetanus imunoglobulin, humani	TETANUS GAMMA	rstvor za injekciju u napunjenoj injekcijskoj sprici	napunjeno injekcijskoj spric, 1 po 1 ml (250 µl /ml)	Kedron S.P.A.	Italija	844,50	-	-	-		STAC
001356	J06BS04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu	HEPATECT CP	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 2 ml (50 µl /ml)	Bioteest Pharma GmbH	Nemacka	7.978,70	-	-	-		
001357	J06BS04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu	HEPATECT CP	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 10 ml (50 µl /ml)	Bioteest Pharma GmbH	Nemacka	36.875,80	-	-	-		
001358	J06BS04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu	HEPATECT CP	rstvor za infuziju	bocica staklena, 1 po 40 ml (50 µl /ml)	Bioteest Pharma GmbH	Nemacka	141.559,00	-	-	-		
001359	J06BS04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku upotrebu	VENBIG	pršlak i rastvarač za rastvor za infuziju	bocica sa pršljačom i ampula sa rastvaračem, 1 po 45 ml (50 µl /ml)	Kedron S.P.A.	Italija	141.559,00	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
0011910	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinarna	ENGERIX B	suspenzija za injekciju	bodica, 100 po 1ml 20mcg/ml	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Beogradska	79.300,00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.	
0011911	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinarna	ENGERIX B	suspenzija za injekciju	bodica, 10 po 0,5 ml (10mcg/0,5ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Beogradska	50.825,90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.	
0011904	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinarna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bodica, 1 po 1 ml (20 mcg/ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	793,00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.	
0011907	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinarna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bodica, 0,5 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	508,30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.	
0011906	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinarna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bodica, 10 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	5.082,60	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.	
0011905	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinarna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bodica, 10 po 1 ml (20 mcg/1 ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	7.930,00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.	
0011686	J07B052	vakcina protiv malih boginja, čvrtog i petog i zauški (zvi) atenuirani virusi morula, rubella i parotitisa)	PRIORIX	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju									Prema programu obavezne imunizacije.	
0011909	J07B052	vakcina protiv malih boginja, zauški i rubela	PRIORIX	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju									Prema programu obavezne imunizacije.	
0011955	J07B052	vakcina protiv malih boginja, zauški i rubela	M-M-R-VAXPRO	injekcija s pršljom	bodica sa pršljom i ampula sa rastvaranjem: 100 po 0,5 ml (10 exp3 CDD, 10 exp3 CC, 10 exp3 D, 10 exp3 CC, 10 exp3 D, 10 exp3 CC, 10 exp3 D, 10 exp3 CDD, 0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Beogradska	1.024,20	-	-	-			
0011695	J07BP03	vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana	IMOVAZ POLIO	pršlak i rastvarač za injekciju u napunjenoj injekcijskoj iglici	bodica sa pršljom i napunjenoj injekcijskoj iglici: 1 po 0,5 ml (40 D, 10 CDD, 10 CC, 10 D, 10 CDD, 0,5 ml + 32 D, 10 CDD, 0,5 ml)	Merck Sharp & Domke B.V.	Holandska	7.584,90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.	
2011700	J07BP04	vakcina protiv dečje paralize (trnala)	TIP 113	craina suspenzija	pršlak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bodica sa rastvaranjem u ampuli, 5 po 0,5 ml (2,5 j./0,5ml)	Sanofi Pasteur S.A.	Francuska	35.525,50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011683	J07B001	vakcina protiv besnila	VERORAB	pršlak i rastvarač za suspenziju za injekciju									Prema programu obavezne imunizacije.	
0011927	J07BK01	vakcina protiv varičelisa, živa	VARIRIX	pršlak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodica i rastvarač u napunjenoj injekcijskoj iglici: 1 po 0,5 ml (10exp3,3PFU/0,5ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Beogradska	3.429,60	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.	
0011925	J07CA06	vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana	INFANRIX-IPV+Hib	pršlak i suspenzija za suspenziju za injekciju	nastavak injekcijske iglice: 1 po 0,5 ml (20 j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D/0,5 ml + 8 D)/0,5 ml + 32 D)/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 8 mcg/0,5 ml + 40 j./0,5 ml + 10 mcg PRP/0,5 ml + 40 mcg Td/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Beogradska	2.182,10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.	
0011929	J07CA06	vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašja (acelularna, komponentna), dečje paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana	PENTAXIM	pršlak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj injekcijskoj iglici ili crve igle	bodica i napunjeni injekcijski iglici: dodatak jedne ili dve igle, 1 po 0,5 ml (20 j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D/0,5 ml + 8 D)/0,5 ml + 32 D)/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 8 mcg/0,5 ml + 40 j./0,5 ml + 10 mcg PRP/0,5 ml)	Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.	Francuska; Mađarska	2.201,00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.	
0031500	L01AA01	ciklofosfamid	ENDOXAN	pršlak za rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 500 mg	Baxter Oncology GmbH	Nemacka	441,40	-	-	-			
0031501	L01AA01	ciklofosfamid	ENDOXAN	pršlak za rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 1 g	Baxter Oncology GmbH	Nemacka	802,30	-	-	-			
0031171	L01AA03	melfalan	MELPHALAN INNVENTA	pršlak za rastvor za injekciju	bodica sa preškom i bodica sa rastvarnjem, 1 po 10 ml (50 mg)	Eriopharm S.A.	Argentina	32.218,00	-	-	-			
0031051	L01AA06	ifosfamid	HOLOXAN	pršlak za rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 1 g	Baxter Oncology GmbH	Nemacka	2.541,50	-	-	-			
1031430	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrdá	kesica, 5 po 5 mg	Shering-Plough Labo N.V.	Beogradska	1.108,30	-	-	-			

Lek se upotrebljava u terapiji, na osnovu mridžljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Klinika za onkologiju KC Srbije,

- Institut za onkologiju i radioterapiju Srbije,

- Institut za onkologiju Vojvodine,

- Klinika za onkologiju KC Niš,

- Kragujevačka akademija,

Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurochirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.

Globusistika multiforme, EC 0 ili 1 (ECOG) isče postoperativnu terapiju u dobi od 75 mg/m2 dnevno, administrirano sa zadržanim kapišnjem. Po završetku zadnjeg, lekova nadavlje formozadrenolitom u dobi od 150/200 mg/m2 chevno od snega do petog dana ekstra je traga 28 dana, ukupno šest ekstra.

Započinjanje hemoterapije se vrši po uvodu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinkom 3-4 nedelje posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1031431	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrdá	kesica, 5 po 20 mg	Shering-Pleugh Labo N.V	Belgija	3.096,00	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m ² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlji temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m ² dnevno od prve do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno sedam ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelje posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Levi se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mrežu prebivališta osiguranog lica.
1031432	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrdá	kesica, 5 po 100 mg	Shering-Pleugh Labo N.V	Belgija	15.316,80	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m ² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlji temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m ² dnevno od prve do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno sedam ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelje posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Levi se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mrežu prebivališta osiguranog lica.
1031433	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrdá	kesica, 5 po 250 mg	Shering-Pleugh Labo N.V	Belgija	30.136,40	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m ² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlji temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m ² dnevno od prve do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno sedam ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelje posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Levi se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mrežu prebivališta osiguranog lica.
0039031	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN	präparat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 500 mg	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	5.242,70	-	-	-		
0039030	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN	präparat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 1000 mg	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	8.826,20	-	-	-		
0039032	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN	präparat za rastvor za injekciju/infuziju	bodica, 10 po 100 mg	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	10.051,50	-	-	-		
0039033	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN	präparat za rastvor za injekciju/infuziju	bodica, 10 po 200 mg	Pfizer (Preth) PTY Limited	Nemačka	20.103,10	-	-	-		
0034180	L01BA01	metotreksat	METHOTREXATE PFIZER	rastvor za injekciju	bodica plastična, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Pfizer (Preth) PTY Limited	Australija	1.869,10	-	-	-		
0034181	L01BA01	metotreksat	METHOTREXATE PFIZER	rastvor za injekciju	bodica plastična, 1 po 20 ml (500 mg/20 ml)	Pfizer (Preth) PTY Limited	Australija	2.637,20	-	-	-		
0034151	L01BA01	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju	nepunjeni injekcioni spic, 1 po 1,5 ml, 15 mg/1,5 ml	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	947,40	-	-	-		
0034153	L01BA01	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju	nepunjeni injekcioni spic, 1 po 2 ml, 20 mg/2 ml	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	1.002,70	-	-	-		
0034154	L01BA01	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju	nepunjeni injekcioni spic, 1 po 2,5 ml, 25 mg/2,5 ml	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	1.230,60	-	-	-		
0034339	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcijskom spicu	nepunjeni injekcioni spic, 1 po 0,375ml (7,5mg/0,375ml)	Ebeewe Pharma Ges.M.B.H.NFG. KG	Austrija	402,00	-	-	-		
0034340	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcijskom spicu	nepunjeni injekcioni spic, 1 po 0,5ml (10mg/0,5ml)	Ebeewe Pharma Ges.M.B.H.NFG. KG	Austrija	519,40	-	-	-		
0034341	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcijskom spicu	nepunjeni injekcioni spic, 1 po 0,0625ml (1,25mg/0,0625ml)	Ebeewe Pharma Ges.M.B.H.NFG. KG	Austrija	563,10	-	-	-		
0034338	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcijskom spicu	nepunjeni injekcioni spic, 1 po 0,75ml (15mg/0,75ml)	Ebeewe Pharma Ges.M.B.H.NFG. KG	Austrija	947,40	-	-	-		
0034332	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcijskom spicu	nepunjeni injekcioni spic, 1 po 1ml (20mg/1ml)	Ebeewe Pharma Ges.M.B.H.NFG. KG	Austrija	1.002,70	-	-	-		
0034025	L01BB04	kladrabin	LITAK	rastvor za injekciju	bodica staklena, 5 po 10 mg/5 ml	Lipomed AG	Švajcarska	155.754,50	-	-	-		STAC
0034600	L01BB05	fludarabin	FLUDARABINE PLIVA	konzentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 2 ml (25 mg/ml)	Pharmacheme B.V. Plive Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	3.840,20	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija i netektinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE očijski limfon, imfoplazmočisti limfon).	STAC: Levi se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omiljene Vojvodine, - Klinika za dečje infekcije bolesti KC Niš, - Univerzitet u Beogradu, - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou u mrežu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034019	L01BB05	fludarabin	FLUDARABIN EBEWE	konzentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 1 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	3.840,20	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija i nefročinkski limfoni (folikularni limfoni, limfomi marginalne zone, MANTLE, celijski limfon, limfoplazmočni limfon).	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. - Klinika za hematologiju KC Srbije. - KC Beograd - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za hematologiju KC Vojvodine. - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Institut za zdravstvenu zaštitu, mještaj i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“. - Matična zdravstvena zaštita dečje i omiljene Vojvodine. - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš. - Univerzitetска dečja klinika. - Vejmomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mreži prebivališta osiguranog lica
0034140	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	präparat i rastvor za rastvor za injekciju	lobocića sa rastvaračem u ampuli, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Actavis Italy S.P.A.	Italija	359,20	-	-	-		
0034141	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	präparat i rastvor za rastvor za injekciju	lobocića sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (500 mg/10 ml)	Actavis Italy S.P.A.	Italija	1.261,70	-	-	-		
0034142	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	präparat i rastvor za rastvor za injekciju	bocića 1 po 1000 mg	Actavis Italy S.P.A.	Italija	2.239,80	-	-	-		
0034350	L01BC01	citarabin	ALEXAN Ebewe	rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena 1 po 100 mg/5 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	227,30	-	-	-		
0034351	L01BC01	citarabin	ALEXAN Ebewe	rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena 1 po 500 mg/10 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1.132,10	-	-	-		
0034352	L01BC01	citarabin	ALEXAN Ebewe	rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 1 po 1000 mg/20 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1.896,30	-	-	-		
0034023	L01BC02	fluouracil	FLUOROURACIL - TEVA	rastvor za injekciju	bocića, 1 po 5 ml (50 mg/ml)	Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company	Holandija; Mađarska	325,30	-	-	-		
0034024	L01BC02	fluouracil	FLUOROURACIL - TEVA	rastvor za injekciju	bocića, 1 po 10 ml (50 mg/ml)	Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company	Holandija; Mađarska	263,10	-	-	-		
0034185	L01BC02	fluouracil	FLUOROURACIL	rastvor za injekciju/infuziju	bocića, 1 po 10 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	421,30	-	-	-		
0034187	L01BC02	fluouracil	FLUOROURACIL	rastvor za injekciju/infuziju	bocića, 1 po 20 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	548,20	-	-	-		
0034188	L01BC02	fluouracil	FLUOROURACIL	rastvor za injekciju/infuziju	bocića, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	1.784,50	-	-	-		
0034326	L01BC02	fluouracil	S-FLUOROURACIL "Ebewe"	konzentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 1 po 5 ml (250mg/5ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	449,30	-	-	-		
0034327	L01BC02	fluouracil	S-FLUOROURACIL "Ebewe"	konzentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 1 po 10 ml (500mg/10ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	422,70	-	-	-		
0034328	L01BC02	fluouracil	S-FLUOROURACIL "Ebewe"	konzentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 1 po 20 ml (1000mg/20ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	549,60	-	-	-		
0034329	L01BC02	fluouracil	S-FLUOROURACIL "Ebewe"	konzentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bocića staklena, 1 po 100 ml (5000mg/100ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	1.785,90	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034426	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 200 mg/20 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG KG	Austrija	528,30	-	-	-	<p>1. Nomicrocularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;</p> <p>2. Urolijalni karcinom (TCC):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) neadjuvantna terapija kod lokalne uznapredovala bolesti (klinički stadijum III/IV); b) sistematska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; <p>3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraktikina i/ili taksona IIII terapie, PS 0 ili 1;</p> <p>4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemoterapije, uznapredovala nereseptabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.</p>	<p>STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sela KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija; <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija; <p>Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za gastroenterologiju KC Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija; <p>- Vejmomedicinska akademija uz učeće stručnjake iz oblasti karcinoma dojke sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa;</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sela KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija; <p>Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija; <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjeru prebivalstva osiguranog lica</p>
0034425	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 1000 mg/100 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG KG	Austrija	2.498,30	-	-	-	<p>1. Nomicrocularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;</p> <p>2. Urolijalni karcinom (TCC):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) neadjuvantna terapija kod lokalne uznapredovala bolesti (klinički stadijum III/IV); b) sistematska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; <p>3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraktikina i/ili taksona IIII terapie, PS 0 ili 1;</p> <p>4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemoterapije, uznapredovala nereseptabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.</p>	<p>STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sela KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija; <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija; <p>Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za gastroenterologiju KC Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija; <p>- Vejmomedicinska akademija uz učeće stručnjake iz oblasti karcinoma dojke sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa;</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sela KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija; <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjeru prebivalstva osiguranog lica</p>

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034551	L01BC05	gemcitabin	GEMNIL	pršak za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 200 mg	Vianex S.A - Plant C	Grčka	528,30	-	-	-	1. Nominocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotegijalni karcinom (TCC); a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum III/II); b) sistematska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karonom dejloj, metastatska bolest, posle prethodne primene antrozotkina i/ili taksona i/ili kapetektabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemoterapije, uznapredovala nereseptabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1;	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez selo KC Niš, - KBC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KBC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dejloja sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KBC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez selo KC Niš, - KBC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjeru prebivalstva osiguranog lica.
0034550	L01BC05	gemcitabin	GEMNIL	pršak za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 1000 mg	Vianex S.A - Plant C	Grčka	2.498,30	-	-	-	1. Nominocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotegijalni karcinom (TCC); a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum III/II); b) sistematska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karonom dejloj, metastatska bolest, posle prethodne primene antrozotkina i/ili taksona i/ili kapetektabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemoterapije, uznapredovala nereseptabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1;	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez selo KC Niš, - KBC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KBC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez selo KC Niš, - KBC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KBC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjeru prebivalstva osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
0034432	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	konzentrat za rastvor za infuziju	staklena boćica, 1 po 5 ml (40mg/ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	Austrija	528,30	-	-	-	1. Nomicrocularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urolijalni karcinom (TCC): a) neadjuvantna terapija kod lokalne uznapredovala bolesti (klinički stadijum III/IV); b) sistematska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraktikina i/ili taksona IIII terapie, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemoterapije, uznapredovala nereseptabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sela KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sela KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija;	Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjeru prebivalstva osiguranog lica
0034431	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	konzentrat za rastvor za infuziju	staklena boćica, 1 po 25 ml (40mg/ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	Austrija	2.498,30	-	-	-	1. Nomicrocularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urolijalni karcinom (TCC): a) neadjuvantna terapija kod lokalne uznapredovala bolesti (klinički stadijum III/IV); b) sistematska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraktikina i/ili taksona IIII terapie, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemoterapije, uznapredovala nereseptabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sela KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sela KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija;	Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjeru prebivalstva osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034429	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	konzentrat za rastvor za infuziju	staklena boćica, 1 po 50 ml (40mg/ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG, KG	Austrija	5,356.80	-	-	-	1. Nominocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotegani karcinom (TCC); a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum III/II); b) sistematska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karonom dejloj, metastatska bolest, posle prethodne primene antrozotikina i/ili taksona i/ili kapetektabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemoterapije, uznapredovala nereseptabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1;	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez selo KC Niš, - KCB Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCB Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dejloja sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCB Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjeru prebivalstva osiguranog lica.
0034008	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN	präparat za rastvor za infuziju	boćica staklena, 1 po 200 mg	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	528.30	-	-	-	1. Nominocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotegani karcinom (TCC); a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum III/II); b) sistematska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karonom dejloj, metastatska bolest, posle prethodne primene antrozotikina i/ili taksona i/ili kapetektabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemoterapije, uznapredovala nereseptabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1;	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez selo KC Niš, - KCB Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez selo KC Niš, - KCB Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCB Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCB Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjeru prebivalstva osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
0034007	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN	präparat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 1000 mg	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	2,498.30	-	-	-	1. Nomičiocularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Uroterijalni karcinom (TCC): a) neadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum III/IV); b) sistematska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dejke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksona IIII kancerolitika, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemoterapije, uznapredovala nereseptabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmone KBC Beograd, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sabor KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Beograd, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sabor KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sabor KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija;	Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica
0034006	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN	präparat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 2000 mg	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	5,356.80	-	-	-	1. Nomičiocularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Uroterijalni karcinom (TCC): a) neadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum III/IV); b) sistematska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dejke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksona IIII kancerolitika, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemoterapije, uznapredovala nereseptabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmone KBC Beograd, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti, Knez sabor KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija;	Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica
1034445	L01BC06	kapcitabin	XALVOBIN [®]	film tabletta	blistar, 120 po 500 mg	Alvogen Pharma d.o.o. Remedica Ltd.	Republika Hrvatska	9,872.70	-	-	-	1. Karcinom dejke: a) metastatski karcinom dejke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksona PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dejke, prva linija sistematske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksona PS 0, 1 ili 2. 2. Kolektivni karcinom: a) adjuvantna hemoterapija u kliničkom stadijumu Duke's "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju metastazi gr. 3-4 na SFU/UV hemoterapiji; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemoterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Beograd, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za onkologiju KC Štefice, - KBC Beograd, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1034450	L01BC06	kapcitabin	ECANSYA	film tablet	120 po 500 mg	Pharmaceo premium LTD Alba, Kros, tovarna zdravil d.d., Slovenija	Malta: Slovenija	9.872,70	-	-	-	1. Karcionom dejstvo: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antracikline VIII taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemске terapije kod pacijentata sa kontraindikacijama za prenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Koorelativni karcinomi: a) adjuvantha hemoterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvanthe terapije, pri razvoju toksicitet gr. 3-4 na SFU/LV hemoterapiji; b) metastatska bolest, kod očekivanog neželjenog efekta na hemoterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učeće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za gastronomerilogiju KC Srbije, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mreži prebivališta osiguranog lica
1034343	L01BC06	kapcitabin	CAPECITABINE PHARMASWISS	film tablet	120 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o	Republika Srbija	9.872,70	-	-	-	1. Karcionom dejstvo: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antracikline VIII taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemске terapije kod pacijentata sa kontraindikacijama za prenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Koorelativni karcinomi: a) adjuvantha hemoterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvanthe terapije, pri razvoju toksicitet gr. 3-4 na SFU/LV hemoterapiji; b) metastatska bolest, kod očekivanog neželjenog efekta na hemoterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učeće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastronomerilogiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mreži prebivališta osiguranog lica
1034443	L01BC06	kapcitabin	KAPETRAL	film tablet	blistер 60 po 150 mg	Remedica Ltd	Kiper	1.622,00	-	-	-	1. Karcionom dejstvo: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina VIII taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemске terapije kod pacijentata sa kontraindikacijama za prenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Koorelativni karcinomi: a) adjuvantha hemoterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvanthe terapije, pri razvoju toksicitet gr. 3-4 na SFU/LV hemoterapiji; b) metastatska bolest, kod očekivanog neželjenog efekta na hemoterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učeće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastronomerilogiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mreži prebivališta osiguranog lica
1034442	L01BC06	kapcitabin	KAPETRAL	film tablet	blistер, 120 po 500 mg	Remedica Ltd	Kiper	9.872,70	-	-	-	1. Karcionom dejstvo: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina VIII taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemске terapije kod pacijentata sa kontraindikacijama za prenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Koorelativni karcinomi: a) adjuvantha hemoterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvanthe terapije, pri razvoju toksicitet gr. 3-4 na SFU/LV hemoterapiji; b) metastatska bolest, kod očekivanog neželjenog efekta na hemoterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učeće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastronomerilogiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mreži prebivališta osiguranog lica
030040	L01CA02	vinokristin	VINCRISTINE PFIZER	rastvor za injekciju/infuziju	bodica plastična, 5 po 1 ml (1mg/ml)	Pfizer (Pretby) PTY Limited	Australija	3.111,10	-	-	-		
030240	L01CA04	vinorelbin	VINORELSIN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 1 ml (10 mg/ml)	Actavis Italy S.p.A. S.C. Sindran-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	1.440,90	-	-	-		
030241	L01CA04	vinorelbin	VINORELSIN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Actavis Italy S.p.A. S.C. Sindran-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	6.484,30	-	-	-		
030243	L01CA04	vinorelbin	VINORELBIN "Ebeewe"	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 1 ml (10 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFQ. KG	Austrija	1.440,90	-	-	-		
030242	L01CA04	vinorelbin	VINORELBIN "Ebeewe"	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFQ. KG	Austrija	6.484,30	-	-	-		
030111	L01CB01	etoposid	ETOPOSID "Ebeewe"	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFQ. KG	Austrija	679,00	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0030121	L01CB01	etopozid	ETOPOSIDE-TEVA	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	679,00	-	-	-		
0030122	L01CB01	etopozid	SINTOPOZID	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	S.C. Sintan-Pharma S.R.L.	Rumunija	679,00	-	-	-		
0039350	L01CD01	paclitaksel	PACLITAXEL Ebewe	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2.627,10	-	-	-	<p>1. Karinom dejic:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenta sa kontraindikacijama za primenu: antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvanthe hemoterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretnan kod tih pacijenata bez kontraindikacija; c) adjuvantha hemoterapija kod nodus pozitivne bolesti, kod selvenčajnog pristupa u kombinaciji sa antraciklinima, u nedjeljnem režimu kod pacijenata bez komorbidnosti vezanih za moguću neželjenu dejstvu leka (npr. kod pacijenata bez pregezitirajuće neuropatije); d) selvenčajna hemoterapija kod nodus negativne bolesti, kao selvenčajni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedjeljnem režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2>3 ili ER + PGR 0 ili 3); e) selvenčajna hemoterapija kod tih pacijenata bez kontraindikacija za moguću neželjenu dejstvu leka (npr. kod pacijenata bez pregezitirajuće neuropatije); f) adjuvantha hemoterapija kod nodus negativne bolesti, kao selvenčajni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedjeljnem režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2>3 ili ER + PGR 0 ili 3); g) karinom ovula: <ul style="list-style-type: none"> a) primarna hemoterapija za uznapredovali klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svjetlozeljski podtip) i grupe 3; b) primarna hemoterapija za uznapredovali klinički stadijum IIb-IV; c) prva linija u relaps bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primari paclitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paclitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paclitaksel u nedjeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma ovula; f) karinom u zidovljanju; g) metastatski oseptični karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platininskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1. 	<p>STAC: Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCG Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz većše stručnjake iz oblasti karcinoma dejice sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije <p>Za indikaciju pod tačkom 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCG Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz većše stručnjake iz oblasti karcinoma dejice sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije <p>Za indikaciju pod tačkom 3 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klinika za pulmologiju KC Srbija, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija, <p>Nastavak lečenja u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili terciјarnom nivou u mesta prebivalista osiguranog lica</p>
0039351	L01CD01	paclitaksel	PACLITAXEL Ebewe	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 100 mg/16,7 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	8.319,90	-	-	-	<p>1. Karinom dejic:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenta sa kontraindikacijama za primenu: antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvanthe hemoterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretnan kod tih pacijenata bez kontraindikacija; c) adjuvantha hemoterapija kod tih pacijenata bez kontraindikacija za moguću neželjenu dejstvu leka (npr. kod pacijenata bez pregezitirajuće neuropatije); d) adjuvantha hemoterapija kod nodus negativne bolesti, kao selvenčajni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedjeljnem režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2>3 ili ER + PGR 0 ili 3); e) selvenčajna hemoterapija kod tih pacijenata bez kontraindikacija za moguću neželjenu dejstvu leka (npr. kod pacijenata bez pregezitirajuće neuropatije); f) adjuvantha hemoterapija za uznapredovali klinički stadijum IIb-IV; g) prva linija u relaps bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primari paclitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paclitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paclitaksel u nedjeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma ovula; f) karinom u zidovljanju; g) metastatski oseptični karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platininskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1. 	<p>STAC: Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCG Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz većše stručnjake iz oblasti karcinoma dejice sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije <p>Za indikaciju pod tačkom 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCG Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz većše stručnjake iz oblasti karcinoma dejice sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije <p>Za indikaciju pod tačkom 3 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klinika za pulmologiju KC Srbija, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija, <p>Nastavak lečenja u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili terciјarnom nivou u mesta prebivalista osiguranog lica</p>
0039500	L01CD01	paclitaksel	PACLITAXEL - TEVA	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	2.627,10	-	-	-	<p>1. Karinom dejic:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenta sa kontraindikacijama za primenu: antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvanthe hemoterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretnan kod tih pacijenata bez kontraindikacija; c) adjuvantha hemoterapija kod tih pacijenata bez kontraindikacija za moguću neželjenu dejstvu leka (npr. kod pacijenata bez pregezitirajuće neuropatije); d) adjuvantha hemoterapija kod nodus negativne bolesti, kao selvenčajni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedjeljnem režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2>3 ili ER + PGR 0 ili 3); e) selvenčajna hemoterapija kod tih pacijenata bez kontraindikacija za moguću neželjenu dejstvu leka (npr. kod pacijenata bez pregezitirajuće neuropatije); f) adjuvantha hemoterapija za uznapredovali klinički stadijum IIb-IV; g) prva linija u relaps bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primari paclitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paclitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paclitaksel u nedjeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma ovula; f) karinom u zidovljanju; g) metastatski oseptični karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platininskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1. 	<p>STAC: Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCG Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz većše stručnjake iz oblasti karcinoma dejice sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije <p>Za indikaciju pod tačkom 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCG Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, <p>Nastavak lečenja u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili terciјarnom nivou u mesta prebivalista osiguranog lica</p>

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0030501	L01CD01	paclitaksel	PACLITAXEL - TEVA	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica 1 po 16.7 ml (100 mg/16.7 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	8.318.90	-	-	-	1. Karcinom dejke: - metastatska bolest, prva linija pois antreksilina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenta sa kontraindikacijama za primenu antreksilina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemoterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retetman kod teškog senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemoterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antreksilinom, u neđeljnom režimu, za pacijente koji nisu prethodno bili eksponirani za neželjene dejstvije leka (nemajući kod pacijenata bez prethodno poznate nezadovoljavajuće rezistencije); d) adjuvantna hemoterapija kod nodus negativne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antreksilinom, u neđeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2>3+ ili ER i PgR 0 ili 63%); e) lokalna uznesenje uklanjanjem karcinoma dojke, selvenčinska primena nakon prethodne primene antreksilina, u slučaju da se očekuje terapijski odgovor na antreksilinu (SD, PD), nejedno do četiri vikluka novog rođenja (12 nedelja); 2. Karcinom ovula: a) primarna hemoterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (sveločelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemoterapija za uznesenje klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za incijacioni klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu prethodno bili eksponirani za postoperativnu pristupu; d) relaps bolesti u postoperativnom periodu; e) paclitaksel u neđeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma ovula; 3. Nemociculani karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinikim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Klinika za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Vojnoredicina akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ii) KBC Bežanijska kosa: Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Klinika za plućne bolesti „Knež sela“ KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnoredicina akademija; Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mrežu prethvalnih osiguranog lica
0030020	L01CD01	paclitaksel	SINDAXEL	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A	Rumunija; Italija	2.627.10	-	-	-	1. Karcinom dejke: - metastatska bolest, prva linija pois antreksilina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenta sa kontraindikacijama za primenu antreksilina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemoterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retetman kod teškog senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemoterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antreksilinom, u neđeljnom režimu, za pacijente koji nisu prethodno bili eksponirani za neželjene dejstvije leka (nemajući kod pacijenata bez prethodno poznate nezadovoljavajuće rezistencije); d) adjuvantna hemoterapija kod nodus negativne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antreksilinom, u neđeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2>3+ ili ER i PgR 0 ili 63%); e) lokalna uznesenje uklanjanjem karcinoma dojke, selvenčinska primena nakon prethodne primene antreksilina, u slučaju da se očekuje terapijski odgovor na antreksilinu (SD, PD), nejedno do četiri vikluka novog rođenja (12 nedelja); 2. Karcinom ovula: a) primarna hemoterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (sveločelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemoterapija za uznesenje klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za incijacioni klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu prethodno bili eksponirani za postoperativnu pristupu; d) relaps bolesti u postoperativnom periodu; e) paclitaksel u neđeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma ovula; 3. Nemociculani karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinikim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Klinika za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Vojnoredicina akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ii) KBC Bežanijska kosa: Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Klinika za plućne bolesti „Knež sela“ KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnoredicina akademija; Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mrežu prethvalnih osiguranog lica
0030021	L01CD01	paclitaksel	SINDAXEL	konzentrat za rastvor za infuziju	1 po 16.67 ml (100 mg/16.67 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A	Rumunija; Italija	8.318.90	-	-	-	1. Karcinom dejke: - metastatska bolest, prva linija pois antreksilina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenta sa kontraindikacijama za primenu antreksilina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemoterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retetman kod teškog senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemoterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antreksilinom, u neđeljnom režimu, za pacijente koji nisu prethodno bili eksponirani za neželjene dejstvije leka (nemajući kod pacijenata bez prethodno poznate nezadovoljavajuće rezistencije); d) adjuvantna hemoterapija kod nodus negativne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antreksilinom, u neđeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2>3+ ili ER i PgR 0 ili 63%); e) lokalna uznesenje uklanjanjem karcinoma dojke, selvenčinska primena nakon prethodne primene antreksilina, u slučaju da se očekuje terapijski odgovor na antreksilinu (SD, PD), nejedno do četiri vikluka novog rođenja (12 nedelja); 2. Karcinom ovula: a) primarna hemoterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (sveločelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemoterapija za uznesenje klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za incijacioni klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu prethodno bili eksponirani za postoperativnu pristupu; d) relaps bolesti u postoperativnom periodu; e) paclitaksel u neđeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma ovula; 3. Nemociculani karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinikim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Klinika za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Vojnoredicina akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ii) KBC Bežanijska kosa: Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Klinika za plućne bolesti „Knež sela“ KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnoredicina akademija; Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mrežu prethvalnih osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1036658	L01CD01	paclitaksel	SINDAXEL [®]	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 25ml (150mg/25ml)	Actavis Italy S.P.A; S.C Sindan-Pharma S.R.L	Italija; Rumunija	12.318,70	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvančne hemoterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retiniran kod teških senzitivnih bolesti; c) adjuvantna hemoterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa entraciklinima, u nedeljnem režimu kod pacijenata vezanih za moguću neželjenu dejstvu leka (npr. kod pacijenata bez prognozirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemoterapija za primenu negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa entraciklinima, u nedeljnem režimu u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (H-E-R 2>3+ ili ER +PGCR 0 ili G3); e) lokalno uzpreduvani karcinom dojke, sekvenčna primena nakon prethodne primene entraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), nejaviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); f) adjuvantna hemoterapija (12 nedelja); g) primarna hemoterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetlocelijkip pedic) i gradac 3; h) primarna hemoterapija za uzpreduvani klinički stadijum IIb-IV; i) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-Ib), za pacijente koji nisu primari pačitaksel u postoperativnom pristupu; j) relaps bolesti u pačitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka je 6 meseci); k) pačitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma dojke; l) 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinim derivatima, klinički stadijum IIb/Iv, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Institut za onkologiju i radiologiju KC Niš, - KCG Krupanj, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - KCG Krupanj, - Vojnomedicinska akademija: Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica
1036652	L01CD01	paclitaksel	PATAKSEL	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, staklena, 1 po 5 ml, 30 mg/5 ml	Vianex S.A - Plant C	Grcka	2.627,10	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvančne hemoterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retiniran kod teških senzitivnih bolesti; c) adjuvantna hemoterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa entraciklinima, u nedeljnem režimu kod pacijenata vezanih za moguću neželjenu dejstvu leka (npr. kod pacijenata bez prognozirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemoterapija za primenu negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa entraciklinima, u nedeljnem režimu u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (H-E-R 2>3+ ili ER +PGCR 0 ili G3); e) lokalno uzpreduvani karcinom dojke, sekvenčna primena nakon prethodne primene entraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), nejaviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); f) adjuvantna hemoterapija (12 nedelja); g) primarna hemoterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetlocelijkip pedic) i gradac 3; h) primarna hemoterapija za uzpreduvani klinički stadijum IIb-IV; i) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-Ib), za pacijente koji nisu primari pačitaksel u postoperativnom pristupu; j) relaps bolesti u pačitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka je 6 meseci); k) pačitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma dojke; l) 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinim derivatima, klinički stadijum IIb/Iv, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Institut za onkologiju i radiologiju KC Niš, - KCG Krupanj, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - KCG Krupanj, - Vojnomedicinska akademija: Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica
1036650	L01CD01	paclitaksel	PATAKSEL	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, staklena, 1 po 16,7 ml, 100 mg/16,7 ml	Vianex S.A - Plant C	Grcka	8.318,90	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvančne hemoterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retiniran kod teških senzitivnih bolesti; c) adjuvantna hemoterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa entraciklinima, u nedeljnem režimu kod pacijenata vezanih za moguću neželjenu dejstvu leka (npr. kod pacijenata bez prognozirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemoterapija za primenu negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa entraciklinima, u nedeljnem režimu u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (H-E-R 2>3+ ili ER +PGCR 0 ili G3); e) lokalno uzpreduvani karcinom dojke, sekvenčna primena nakon prethodne primene entraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), nejaviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); f) adjuvantna hemoterapija (12 nedelja); g) primarna hemoterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetlocelijkip pedic) i gradac 3; h) primarna hemoterapija za uzpreduvani klinički stadijum IIb-IV; i) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-Ib), za pacijente koji nisu primari pačitaksel u postoperativnom pristupu; j) relaps bolesti u pačitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka je 6 meseci); k) pačitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma dojke; l) 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinim derivatima, klinički stadijum IIb/Iv, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Institut za onkologiju i radiologiju KC Niš, - KCG Krupanj, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - KCG Krupanj, - Vojnomedicinska akademija: Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1030851	L01CD01	paklitaksel	PATAKSEL	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 50 ml/300 mg/50ml	Vianex S.A - Plant C	Grčka	24.153,30	-	-	-	1. Karcinom dejke: - si metastatske bolesti, prva linija počela antracikine, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenta sa kontraindikacijama za primenu antracikina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemoterapije); - b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retetman kod lešansk sensitivne bolesti; - c) adjuvantna hemoterapija kod nodusi pozitivne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nekoliko intervala, kod pacijenata koji nisu prethodno primeni liječenje vezano za moguću rezljajuću doznu leku (nisi kod pacijenata bez prethodnog reagiranja); - d) adjuvantna hemoterapija kod nodusi negativne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedjeljnju redizmu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2>3+ ili ER i PGR 0 ili G3); - e) lokalna uznesenja uključujući karcinom dejke, selvenčinska primena nakon prethodne primene antraciklina, u sljedećem terapijskom odgovoru na antracikine (SO, PD), nejude do četiri vikuna novog redizma (12 nedelja); 2. Karcinom ovula/jums: - a) primarna hemoterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (velocijejski pedip) i gradus 3; - b) primarna hemoterapija za uznesenje klinički stadijum (IIb-IV); - c) prva linija u relaps bolesti, za incijacioni klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu prethodno primenili u postoperativnom pristupu; - d) relaps bolesti u postoperativnom pristupu; - e) paklitaksel u nedjeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma ovula/jums; 3. Nemociculani karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinikim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Beogradskata kosa, - Klinika za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Vojnoredicina akademija uz učeće stručnjaka iz oblasti karcinoma dejke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ii) KBC Beogradskata kosa: Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Vojnoredicina akademija uz učeće stručnjaka iz oblasti karcinoma dejke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije iii) KBC Beogradskata kosa: Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Klinika za onkologiju KC Niš, - Institut za onkologiju i radiologiju KC Niš, - Klinika za plućne bolesti „Knež sela“ KC Niš, - KBC Beogradskata kosa, - Vojnoredicina akademija; Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mrežu prethvalnih osiguranog lica
1030853	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 5 ml (6mg/ml)	Preserious Kabl Oncology PLC	Velika Britanija	2.627,10	-	-	-	1. Karcinom dejke: - si metastatske bolesti, prva linija počela antracikine, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenta sa kontraindikacijama za primenu antracikina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemoterapije); - b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retetman kod lešansk sensitivne bolesti; - c) adjuvantna hemoterapija kod nodusi pozitivne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nekoliko intervala, kod pacijenata koji nisu prethodno primeni liječenje vezano za moguću rezljajuću doznu leku (nisi kod pacijenata bez prethodnog reagiranja); - d) adjuvantna hemoterapija kod nodusi negativne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedjeljnju redizmu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2>3+ ili ER i PGR 0 ili G3); - e) lokalna uznesenja uključujući karcinom dejke, selvenčinska primena nakon prethodne primene antraciklina, u sljedećem terapijskom odgovoru na antracikine (SO, PD), nejude do četiri vikuna novog redizma (12 nedelja); 2. Karcinom ovula/jums: - a) primarna hemoterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (velocijejski pedip) i gradus 3; - b) primarna hemoterapija za uznesenje klinički stadijum (IIb-IV); - c) prva linija u relaps bolesti, za incijacioni klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu prethodno primenili u postoperativnom pristupu; - d) relaps bolesti u postoperativnom pristupu; - e) paklitaksel u nedjeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma ovula/jums; 3. Nemociculani karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinikim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Beogradskata kosa, - Klinika za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Vojnoredicina akademija uz učeće stručnjaka iz oblasti karcinoma dejke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ii) KBC Beogradskata kosa: Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Klinika za onkologiju KC Niš, - Institut za onkologiju i radiologiju KC Niš, - Klinika za plućne bolesti „Knež sela“ KC Niš, - KBC Beogradskata kosa, - Vojnoredicina akademija; Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mrežu prethvalnih osiguranog lica
1030854	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 16,7 ml (6mg/ml)	Preserious Kabl Oncology PLC	Velika Britanija	8.318,90	-	-	-	1. Karcinom dejke: - si metastatske bolesti, prva linija počela antracikine, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenta sa kontraindikacijama za primenu antracikina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemoterapije); - b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retetman kod lešansk sensitivne bolesti; - c) adjuvantna hemoterapija kod nodusi pozitivne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nekoliko intervala, kod pacijenata koji nisu prethodno primeni liječenje vezano za moguću rezljajuću doznu leku (nisi kod pacijenata bez prethodnog reagiranja); - d) adjuvantna hemoterapija kod nodusi negativne bolesti, kao selvenčinski pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedjeljnju redizmu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2>3+ ili ER i PGR 0 ili G3); - e) lokalna uznesenja uključujući karcinom dejke, selvenčinska primena nakon prethodne primene antraciklina, u sljedećem terapijskom odgovoru na antracikine (SO, PD), nejude do četiri vikuna novog redizma (12 nedelja); 2. Karcinom ovula/jums: - a) primarna hemoterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (velocijejski pedip) i gradus 3; - b) primarna hemoterapija za uznesenje klinički stadijum (IIb-IV); - c) prva linija u relaps bolesti, za incijacioni klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu prethodno primenili u postoperativnom pristupu; - d) relaps bolesti u postoperativnom pristupu; - e) paklitaksel u nedjeljnim intervalima kao „salvage“ hemoterapija metastatskog karcinoma ovula/jums; 3. Nemociculani karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinikim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Beogradskata kosa, - Klinika za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Vojnoredicina akademija uz učeće stručnjaka iz oblasti karcinoma dejke sa Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ii) KBC Beogradskata kosa: Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; - Klinika za onkologiju KC Niš, - Institut za onkologiju i radiologiju KC Niš, - Klinika za plućne bolesti „Knež sela“ KC Niš, - KBC Beogradskata kosa, - Vojnoredicina akademija; Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mrežu prethvalnih osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0036725	L01CD02	docetaxel	DOCETAXEL SANDOZ	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 20 mg/2 ml	Ebewe Pharma GmbH NFG KG	Austrija	2.334,30	-	-	-	1. Karinom dejke: a) metastatska bolest, prva linija posle antrekdina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnika sa visokim rizikom za relaps, kao sekundarni pristup, u kombinaciji sa antrekdinom); b) metatastska bolest PS 0 ili 1 - retetman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvančna hemoterapija kod nadus pozitivne bolesti, preventivno kod bolesnika sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekundarni pristup, u kombinaciji sa antrekdinom; d) lokalno uznapredovali karcinom dejke, sekundarnija primarna nakon prethodne primene antrekdina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antreksilin (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Njemirocelularni karcinom pluća, druga linija hemoterapije, klinički stadijum IIb, PS 0 ili 1, posle platiniskog dubleta. 3. Karinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uводи у терапију на основу мишљења три лекара следећих здравствених установа: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učeće stručnjaka iz oblasti karcinoma dejke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uводи у терапију на основу мишљења три лекара следећих здравствених установа: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3, lek se uводи у терапију на основу мишљења три лекара следећих здравствених установа: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija. Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica
0036796	L01CD02	docetaxel	DOCETAXEL SANDOZ	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 80 mg/8 ml	Ebewe Pharma GmbH NFG KG	Austrija	8.715,30	-	-	-	1. Karinom dejke: a) metastatska bolest, prva linija posle antrekdina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnika sa visokim rizikom za relaps, kao sekundarni pristup, u kombinaciji sa antrekdinom); b) metatastska bolest PS 0 ili 1 - retetman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvančna hemoterapija kod nadus pozitivne bolesti, preventivno kod bolesnika sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekundarni pristup, u kombinaciji sa antrekdinom; d) lokalno uznapredovali karcinom dejke, sekundarnija primarna nakon prethodne primene antrekdina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antreksilin (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Njemirocelularni karcinom pluća, druga linija hemoterapije, klinički stadijum IIb, PS 0 ili 1, posle platiniskog dubleta. 3. Karinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uводи у терапију на основу мишљења три лекара следећих здравствених установа: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učeće stručnjaka iz oblasti karcinoma dejke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uводи у терапију на основу мишљења три лекара следећих здравствених установа: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3, lek se uводи у терапију на основу мишљења три лекара следећих здравствених установа: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija. Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica
0036727	L01CD02	docetaxel	DOCETAXEL	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)	Actavis Italy S.p.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	2.334,30	-	-	-	1. Karinom dejke: a) metastatska bolest, prva linija posle antrekdina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnika sa visokim rizikom za relaps, kao sekundarni pristup, u kombinaciji sa antrekdinom); b) metatastska bolest PS 0 ili 1 - retetman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvančna hemoterapija kod nadus pozitivne bolesti, preventivno kod bolesnika sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekundarni pristup, u kombinaciji sa antrekdinom; d) lokalno uznapredovali karcinom dejke, sekundarnija primarna nakon prethodne primene antrekdina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antreksilin (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Njemirocelularni karcinom pluća, druga linija hemoterapije, klinički stadijum IIb, PS 0 ili 1, posle platiniskog dubleta. 3. Karinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uводи у терапију на основу мишљења три лекара следећих здравствених установа: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uводи у терапију на основу мишљења три лекара следећих здравствених установа: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija. Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0030728	L01CD02	docetaxel	DOCETAXEL	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)	Actavis Italy S.p.A.; S.C. Sintan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	8.715,30	-	-	-	1. Karcinom dejlo: a) metastatska bolest, prva linija podje antraciklina, PS 0 ili 1 (zem kod bolesnika sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvanrne hemoterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retetman kod talksan seržitivne bolesti; c) adjuvantna terapija kod lokalno potencijalno pozitivne bolesti, kada je bolesnica sa vremena do 6 mesečnog razdoblja za razliku od sekundarnog pretrapa, u kombinaciji sa antreciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dejlo, sekundarna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do peti ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemoterapije, klinički stadijum IIb, PS 0 ili 1, posle plastičnog dubleta. 3. Karcinom prostate, homogen rektalno bolest, bez znatnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz rezakciju nevo serumskog testosterona (>0,5 ng/ml).	STAC. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Institut za onkologiju KC Niš, - KBC Knjaževac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dejlo sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju Vojvodine, - Institut za onkologiju KC Niš, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciјarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0030001	L01CD02	docetaxel	TOLNEXA	konzentrat za rastvor za infuziju	1 po 4 ml (80mg/4ml)	Krka, Tovars Zdravil d.d.	Slovenija	8.715,30	-	-	-	1. Karcinom dejlo: a) metastatska bolest, prva linija podje antraciklina, PS 0 ili 1 (zem kod bolesnika sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvanrne hemoterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retetman kod talksan seržitivne bolesti; c) adjuvantna terapija kod lokalno potencijalno pozitivne bolesti, kada je bolesnica sa vremena do 6 mesečnog razdoblja za razliku od sekundarnog pretrapa, u kombinaciji sa antreciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dejlo, sekundarna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do peti ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemoterapije, klinički stadijum IIb, PS 0 ili 1, posle plastičnog dubleta. 3. Karcinom prostate, homogen rektalno bolest, bez znatnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz rezakciju nevo serumskog testosterona (>0,5 ng/ml).	STAC. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Institut za onkologiju KC Niš, - KBC Knjaževac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dejlo sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - KBC Bežanijska kosa, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciјarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0033050	L01DB01	dokosubicin	SINDROXOCIN	pršavak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica, 1 po 10 mg	S.C. Sintan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.	Rumunija; Italija	616,90	-	-	-		
0033051	L01DB01	dokosubicin	SINDROVOCIN	pršavak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica, 1 po 20 mg	S.C. Sintan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.	Rumunija; Italija	1.366,90	-	-	-		
0033190	L01DB01	dokosubicin	DOXORUBICIN "Ebewo"	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 5 ml (10 mg/5 ml)	Ebewo Pharma Ges. M.B.H. NFG. KG	Austrija	534,70	-	-	-		
0033191	L01DB01	dokosubicin	DOXORUBICIN "Ebewo"	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 25 ml (50 mg/25 ml)	Ebewo Pharma Ges. M.B.H. NFG. KG	Austrija	1.733,40	-	-	-		
0033102	L01DB01	dokosubicin	ADRIBLASTINA RD	pršavak i rastvarač za rastvor za injekciju	bodica sa preškom i ampula	Actavis Italy S.p.A.	Italija	851,10	-	-	-		
0033103	L01DB01	dokosubicin	ADRIBLASTINA RD	pršavak za rastvor za injekciju	bodica, 1 po 50 mg	Actavis Italy S.p.A.	Italija	1.210,10	-	-	-		
0033060	L01DB02	dauonrubicin	DAUNOBLASTINA	pršavak i rastvarač za rastvor za injekciju	lobodica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (20 mg/10 ml)	Actavis Italy S.P.A.	Italija	1.120,30	-	-	-		
0033112	L01DB03	epirubicin	FARMORUBICIN R.D.	injekcija	1 po 10 mg sa rastv.	Actavis Italy S.P.A.	Italija	297,20	-	-	-		
0033113	L01DB03	epirubicin	FARMORUBICIN R.D.	injekcija	1 po 50 mg sa rastv.	Actavis Italy S.P.A.	Italija	1.465,90	-	-	-		
0033130	L01DB03	epirubicin	EPISINDAN	liofilizat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 10 mg	S.C. Sintan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.	Rumunija; Italija	297,20	-	-	-		
0033131	L01DB03	epirubicin	EPISINDAN	liofilizat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 50 mg	S.C. Sintan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.	Rumunija; Italija	1.485,90	-	-	-		
0033121	L01DB03	epirubicin	EPIRUBICIN	injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 50 ml (2 mg/ml)	Medac GmbH	Nemačka	1.046,70	-	-	-		
0033122	L01DB03	epirubicin	EPIRUBICIN	injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 50 ml (2 mg/ml)	Medac GmbH	Nemačka	5.241,80	-	-	-		
0033123	L01DB03	epirubicin	EPIRUBICIN	rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Medac GmbH	Nemačka	10.463,40	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0033241	L01DB07	mitoksantron	MITOXANTRON "Ebewe"	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 10 mg/5 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	5.403,80	-	-	-	1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije; 2. Sekundarna progresivna multipla skleroz	<p>STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska klinika, - Institut za zdravstvenu zaštitu dečja i omiljene Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu dečja i omiljene Vojvodine, - Klinika za hematologiju Iđinčku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu dečja i omiljene Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Vojnomedicinska akademija; <p>Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica</p>
0033242	L01DB07	mitoksantron	MITOXANTRON "Ebewe"	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 20 mg/10 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	10.362,30	-	-	-	1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije; 2. Sekundarna progresivna multipla skleroz	<p>STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za zdravstvenu zaštitu dečja i omiljene Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju Iđinčku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu dečja i omiljene Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Vojnomedicinska akademija; <p>Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica</p>
0033220	L01DC01	bleomicin	BLEOCLIN-S	präparat za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 1 po 15000 i.j.	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	2.247,70	-	-	-		
0031330	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN "Ebewe"	rastvor za infuziju	1 po 10 mg/20 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	333,30	-	-	-		
0031332	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN "Ebewe"	rastvor za infuziju	1 po 50 mg/100 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1.310,90	-	-	-		
0031250	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN PFIZER	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica plastična, 1 po 10 ml (1 ng/ml)	Pfizer (Perth) PTY Limited	Australija	793,20	-	-	-		
0031251	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN PFIZER	rastvor za infuziju	bodica plastična, 1 po 50 ml (1 ng/ml)	Pfizer (Perth) PTY Limited	Australija	914,00	-	-	-		
0031223	L01XA01	cisplatin	SINPLATIN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 10 ml (10 mg/10 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.p.A.	Rumunija, Italija	339,80	-	-	-		
0031224	L01XA01	cisplatin	SINPLATIN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.p.A.	Rumunija, Italija	1.332,70	-	-	-		
0031240	L01XA02	karboplatin	CARBOPLATIN PFIZER	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica plastična, 1 po 15 ml (10 mg/ml)	Pfizer (Perth) PTY Limited	Australija	1.685,40	-	-	-		
0031306	L01XA02	karboplatin	CARBOPLASIN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 15 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.p.A.	Rumunija, Italija	1.665,40	-	-	-		
0031307	L01XA02	karboplatin	CARBOPLASIN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.p.A.	Rumunija, Italija	5.770,80	-	-	-		
0031364	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN-PLIVA	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Holandija; Hrvatska	2.437,40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoroprimidinima.	<p>STAC: Lek se uvođe u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; <p>Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica</p>
0031365	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN-PLIVA	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Holandija; Hrvatska	4.874,90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoroprimidinima.	<p>STAC: Lek se uvođe u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; <p>Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica</p>
0031367	L01XA03	oksaliplatin	SINOXAL	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)	Actavis Italy S.p.A.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	2.437,40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoroprimidinima.	<p>STAC: Lek se uvođe u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; <p>Nestavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delostnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica</p>

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031368	L01XA03	oksalipatin	SINOXAL	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 20 ml (100 mg/20 ml)	Adonis Italy S.p.A.; S.C. Sardin-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	4.874,90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoroprimidinima.	STAC: Lek se uvede u terapiju na osnovu mlijenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0031402	L01XA03	oksalipatin	OXALIPLATIN EBEWE	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2.437,40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoroprimidinima.	STAC: Lek se uvede u terapiju na osnovu mlijenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0031403	L01XA03	oksalipatin	OXALIPLATIN EBEWE	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	4.874,90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoroprimidinima.	STAC: Lek se uvede u terapiju na osnovu mlijenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0031363	L01XA03	oksalipatin	OXALIPLATIN KABI	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 10 ml (5mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	2.437,40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoroprimidinima.	STAC: Lek se uvede u terapiju na osnovu mlijenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0031362	L01XA03	oksalipatin	OXALIPLATIN KABI	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica, 1 po 20 ml (5mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	4.874,90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoroprimidinima.	STAC: Lek se uvede u terapiju na osnovu mlijenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0031371	L01XA03	oksalipatin	GOXYRAL	präparat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 100 mg	Eliotchem S.A.	Argentina	4.874,90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoroprimidinima.	STAC: Lek se uvede u terapiju na osnovu mlijenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0031370	L01XA03	oksalipatin	GOXYRAL	präparat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 50 mg	Eliotchem S.A.	Argentina	2.437,40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoroprimidinima.	STAC: Lek se uvede u terapiju na osnovu mlijenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1036394	L01XE01	imatrinib	ALVOTINIB	film tablet	blistер, 120 po 100 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd	Republika Srbija; Malta; Kipar	54.963,60	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom (il) sa torabi rezandranom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tickom 1, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za dečju i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vejnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mreži prebivalstva osiguranog lica. Za indikaciju pod tickom 2, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastronterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KBC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mreži prebivalstva osiguranog lica.
1039397	L01XE01	imatrinib	ALVOTINIB	film tablet	blistер, 30 po 400 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd	Republika Srbija; Malta; Kipar	54.960,00	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom (il) sa torabi rezandranom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tickom 1, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za dečju i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vejnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mreži prebivalstva osiguranog lica. Za indikaciju pod tickom 2, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastronterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KBC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mreži prebivalstva osiguranog lica.
1036392	L01XE01	imatrinib	IMATINIB PHARMASWISS	film tablet	blistер, 120 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	54.963,60	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom (il) sa torabi rezandranom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tickom 1, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za dečju i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vejnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mreži prebivalstva osiguranog lica. Za indikaciju pod tickom 2, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastronterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KBC Kragujevac, - Vejnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mreži prebivalstva osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039006	L01XE01	imatinib	MEAXIN	film tablet	blistер, 60 po 100 mg	Krika, tovarna zdravlj d.d	Slovenija	27.491,80	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearranžmanom, u svim fazama bolesti: kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uводи у терапију на основу мишљења тр лекара следећих здравствених установа: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omiljenu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vulkan Čupić“, - Vejmomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica.
1039007	L01XE01	imatinib	MEAXIN	film tablet	blistер, 120 po 100 mg	Krika, tovarna zdravlj d.d	Slovenija	54.963,80	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearranžmanom, u svim fazama bolesti: kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uводи у терапију на основу мишљења тр лекара следећих zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omiljenu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vulkan Čupić“, - Vejmomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica.
1039009	L01XE01	imatinib	MEAXIN	film tablet	blistер, 30 po 400 mg	Krika, tovarna zdravlj d.d	Slovenija	54.960,00	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearranžmanom, u svim fazama bolesti: kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uводи у терапију на основу мишљења тр лекара следећих zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omiljenu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vulkan Čupić“, - Vejmomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039960	L01XE01	imatinib	IMAREM	film tablet	blistер, 120 pc 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	54.963,60	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia genotipom ili sa borobi rezandranom, u svim fazama bolesti, kao monoterapiju ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tackom 1, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara slijedećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za dečju i omiljenu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vušan Čupić”, - Vejmomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica. Za indikaciju pod tackom 2, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara slijedećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastronadoljegiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica.
1039961	L01XE01	imatinib	IMAREM	film tablet	blistер, 30 pc 400 mg	Remedica Ltd.	Kipar	54.960,00	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia genotipom ili sa borobi rezandranom, u svim fazama bolesti, kao monoterapiju ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tackom 1, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara slijedećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za dečju i omiljenu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vušan Čupić”, - Vejmomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica. Za indikaciju pod tackom 2, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara slijedećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastronadoljegiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica.
1039386	L01XE01	imatinib	PLIVATINIB	film tablet	blistер, 60 pc 100mg	Plive Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	27.491,80	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia genotipom ili sa borobi rezandranom, u svim fazama bolesti, kao monoterapiju ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tackom 1, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara slijedećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za dečju i omiljenu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vušan Čupić”, - Vejmomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica. Za indikaciju pod tackom 2, lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara slijedećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastronadoljegiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica.
0036291	L01XX19	irinotekan	CAMPTO	konzentrat za rastvor za infuziju	1 po 100 mg/5 ml	Pfizer (Perth) PTY Ltd.	Australija	2.883,20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvođi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara slijedećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastronadoljegiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vejmomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039290	L01XX19	irinotekan	CAMPTO	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica plastična, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	1,259.70	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0039296	L01XX19	irinotekan	CAMPTO	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica plastična, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml)	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	9,834.30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0039295	L01XX19	irinotekan	IRINOTESIN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A.	Rumunija; Italija	1,259.70	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0039294	L01XX19	irinotekan	IRINOTESIN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	2,883.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0039317	L01XX19	irinotekan	VARIATEC	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Vianex S.A.	Grčka	1,259.70	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0039314	L01XX19	irinotekan	VARIATEC	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Vianex S.A.	Grčka	2,883.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0039297	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 2 ml (40mg/2ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	1,259.70	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0039298	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 5 ml (100mg/5ml)	Preserious Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	2,883.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica
0039299	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN	konzentrat za rastvor za infuziju	bodica staklena, 1 po 15 ml (300mg/15ml)	Preserious Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	9,834.30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemoterapija lokalno odmaklog/neresektibilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0038302	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN	konzentrat za rastvor za infuziju	bocića staklena, 1 po 25 ml (500mg/25ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	17.797,50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmakljiveneresistabilno ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	<p>STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radioterapiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica</p>
0039100	L01XX32	bonezomib	VELCADE	präparat za rastvor za injekciju	1 po 3,5 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Beograda	54.702,80	-	-	-	Multipi mjeđun: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (kiliens kreatinin manji od 50 ml/min) i/ili citogenetskim abnorminalnostima visokog rizika (del 13, t(4; 14), t(14; 16)) i/ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo znacajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	<p>STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radioterapiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac; <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.</p>
0039101	L01XX32	bonezomib	VELCADE	präparat za rastvor za injekciju	bocića staklena, 1 po 1 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Beograda	12.156,20	-	-	-	Multipi mjeđun: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (kiliens kreatinin manji od 50 ml/min) i/ili citogenetskim abnorminalnostima visokog rizika (del 13, t(4; 14), t(14; 16)) i/ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo znacajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	<p>STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radioterapiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac; <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.</p>
0039666	L01XX32	bonezomib	BORTEADE	präparat za rastvor za injekciju	bocića staklena, 1 po 3,5 mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srpska	54.702,80	-	-	-	Multipi mjeđun: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (kiliens kreatinin manji od 50 ml/min) i/ili citogenetskim abnorminalnostima visokog rizika (del 13, t(4; 14), t(14; 16)) i/ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo znacajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	<p>STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radioterapiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac; <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.</p>
0039110	L01XX32	bonezomib	BORTEZOMIB PLIVA	präparat za rastvor za injekciju	bocića staklena, 1 po 1 mg	Pilote Hrvatska d.o.o.; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Hrvatska, Međimurska	12.156,20	-	-	-	Multipi mjeđun: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (kiliens kreatinin manji od 50 ml/min) i/ili citogenetskim abnorminalnostima visokog rizika (del 13, t(4; 14), t(14; 16)) i/ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo znacajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	<p>STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radioterapiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac; <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.</p>
0039111	L01XX32	bonezomib	BORTEZOMIB PLIVA	präparat za rastvor za injekciju	bocića staklena, 1 po 3,5 mg	Pilote Hrvatska d.o.o.; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Hrvatska, Međimurska	54.702,80	-	-	-	Multipi mjeđun: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (kiliens kreatinin manji od 50 ml/min) i/ili citogenetskim abnorminalnostima visokog rizika (del 13, t(4; 14), t(14; 16)) i/ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo znacajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	<p>STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radioterapiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac; <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.</p>
0039601	L01XX32	bonezomib	BORTEZOMIB PHARMAS	präparat za rastvor za injekciju	bocića staklena, 1 po 3,5 mg	Synthron S.R.O.; Synthon Hispania, S.L.	Češka; Španija	54.702,80	-	-	-	Multipi mjeđun: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (kiliens kreatinin manji od 50 ml/min) i/ili citogenetskim abnorminalnostima visokog rizika (del 13, t(4; 14), t(14; 16)) i/ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo znacajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	<p>STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu miješanja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institut za onkologiju i radioterapiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac; <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.</p>

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog licca	Indikacija	Napomena
0039114	L01XX32	bortezomib	VORTEMYEL	pršač za rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 1 mg	Alvogen Pharma d.o.o. Synthon Hispania, S.L. Synthon S.R.O.	Republika Srbija; Španja; Česka	12,156,20	-	-	-	Multipli miješaj: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klijens kreatinina manji od 60 ml/min) ili citogenetski abnormalnošta visokog rizika (det 13, t(4;14), t(14;16)) i/ili sa rizikom od tromboembolijske komplikacije; b) u redutivnoj bolesti uz odsustvo znatne periferne polineuropatijske (WHO gradus 2-4).	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hemato logiju KC Srbije, - KBC Beogradski Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hemato logiju KC Vojvodine, - Klinika za hemato logiju i lidičku imunologiju KC Niš, - KBC Kragujevac, - Vojne medicinske akademije. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mjeru prebivalstva osiguranog lica.
0039115	L01XX32	bortezomib	VORTEMYEL	pršač za rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 3,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o. Synthon Hispania, S.L. Synthon S.R.O.	Republika Srbija; Španja; Česka	54,702,80	-	-	-	Multipli miješaj: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klijens kreatinina manji od 60 ml/min) ili citogenetski abnormalnošta visokog rizika (det 13 (t(4;14), t(14;16)) i/ili sa rizikom od tromboembolijske komplikacije; b) u redutivnoj bolesti uz odsustvo znatne periferne polineuropatijske (WHO gradus 2-4).	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hemato logiju KC Srbije, - KBC Beogradski Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hemato logiju KC Vojvodine, - Klinika za hemato logiju i lidičku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KBC Kragujevac, - Vojne medicinske akademije. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mjeru prebivalstva osiguranog lica.
0037021	L02AE02	leuprorelin	LUPRON	pršač i rastvarač za suspenziju za injekciju u napušnjom injeckionom sprici	nepušnjem injeckioni spric, 1 po 1 ml (3,75 mg/ml)	Abbott Laboratories S.A.; AbbVie Logistics B.V.	Španja; Holandija	9,765,40	0,134 mg	348,99	-	1. Endometrijska (N80); 2. Metakranična kastracija za karcinom doje (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC: Lek se uvedi u terapiju pod tackom 1 i 2, na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tackom 3 i 4, na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037020	L02AE02	leuprorelin	LUPRON	pršač i rastvarač za suspenziju za injekciju	nepušnjem injeckioni spric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1,25 mg/ml)	Abbott Laboratories S.A.; AbbVie Logistics B.V.	Španja; Holandija	28,862,20	0,134 mg	343,78	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC: Lek se uvedi u terapiju pod tackom 1 i 2, na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tackom 3 i 4, na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037022	L02AE02	leuprorelin	ELIGARD	pršač i rastvarač za rastvor za injekciju	nepušnjem injeckioni spric sa rastvaračem, 1 po 45 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	56,060,90	0,134 mg	165,94	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037023	L02AE02	leuprorelin	LUTRATE DEPO	pršač i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženom odeljivanjem	bodica sa preškom i napušnjem injeckioni spric sa rastvaračem, 1 po 3,75 mg	GP Pharm, SA	Španja	8,769,80	0,134 mg	316,81	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037024	L02AE02	leuprorelin	LUTRATE DEPO	pršač i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženom odeljivanjem	bodica sa preškom i napušnjem injeckioni spric sa rastvaračem, 1 po 22,5 mg	GP Pharm, SA	Španja	22,032,80	0,134 mg	132,36	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037070	L02AE03	goserelin	ZOLADEX	implant u napušnjom injeckionom spricu	nepušnjem injeckioni spric, 1 po 3,6 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	10,365,20	0,129 mg	372,14	-	1. Endometrijska (N80); 2. Metakranična kastracija za karcinom doje (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1); 5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score>6), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	STAC: Lek se uvedi u terapiju pod tackom 1 i 2, na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tackom 3, 4 i 5, na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tackom 6, na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037071	L02AE03	goserelin	ZOLADEX LA	implant	nepušnjem injeckioni spric, 1 po 10,8 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	31,197,20	0,129 mg	372,63	-	1. Endometrijska (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61); 3. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score>6), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037091	L02AE04	triplorelin	DIPHENERLINE	pršač i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženom odeljivanjem	bodica sa preškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (3,75 mg/2 ml)	Ipsen Pharma Biotech, PharmaSwiss d.o.o.	Franckuska; Republika Srbija	10,146,10	0,134 mg	362,55	-	1. Endometrijska (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prenasti pubertet (E22.5). Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	STAC: Lek se uvedi u terapiju pod tackom 1, na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tackom 2 i 3, na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tackom 4, na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037092	L02AE04	triplorelin	DIPHENERLINE	pršač i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženom odeljivanjem	bodica sa preškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (11,25 mg/2 ml)	Ipsen Pharma Biotech, PharmaSwiss d.o.o.	Franckuska; Republika Srbija	30,438,20	0,134 mg	362,55	-	1. Endometrijska (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prenasti pubertet (E22.8).	STAC: Lek se uvedi u terapiju pod tackom 1, na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tackom 2 i 3, na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tackom 4, na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037093	L02AE04	triplorelin	DIPHENERLINE	pršač i rastvarač za rastvor za injekciju	bodica sa preškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (2,25 mg/2 ml)	Ipsen Pharma Biotech	Franckuska	60,876,50	0,134 mg	362,55	-	1. Endometrijska (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prenasti pubertet (E22.8).	STAC: Lek se uvedi u terapiju pod tackom 1, na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037090	L02AE04	triplorelin	DIPHENERLINE	pršač i rastvarač za rastvor za injekciju	bodica sa preškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 1 ml (0,1 mg/1 ml)	PharmaSwiss d.o.o., Ipsen Pharma Biotech	Republika Srbija; Francuska	3,292,80	0,1 mg	470,40	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037095	L02AE04	triplorelin	DECAPROPTYL	pršač i rastvarač za rastvor za injekciju	nepušnjem injeckionim spric, 7,501 ml (0,1mg/ml)	Ferring International Center SA	Nemacka; Srpska	3,292,80	0,1 mg	470,40	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	STAC: Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039715	L02BA03	fluvastatin	FASLODEX	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom spricu	nапуњен инјекциони сприј са иглом 2 po 250mg/5 ml	Astrazeneca UK limited	Velika Britanija	57.430,10	6,3 mg	953,34	-	Za postmenopauzne pacijentkinje sa HR-positivnim metastatskim karcinomom dojke, PS 0-2, za koje se procenjuje da su podobne za narednu hormonsku terapiju, posle tamoksifena i inhibitora aromataze (ili posle samo jednog od navedenih lekova u slučaju kontraindikacije za drugi), bez obzira na prethodnu sekvencu (redosled) primene tamoksifena i inhibitora aromataze (C 50).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojskoline, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KCG Kragujevac - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou u mjestu prebivališta osiguranog lica.
0069137	L03AA02	figursabin	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom spricu	nапуњен инјекциони сприј 5 po 0,2 ml (12M/0,2ml)	Hospira Enterprises B.V.; Hospira Zagreb d.o.o.	Holandija; Republika Hrvatska	11.843,60	0,35 mg	6.908,77	-		STAC
0069138	L03AA02	figursabin	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom spricu	nапуњен инјекциони сприј 5 po 0,5 ml (30M/0,5ml)	Hospira Enterprises B.V.; Hospira Zagreb d.o.o.	Holandija; Republika Hrvatska	16.264,50	0,35 mg	4.261,72	-		STAC
0069139	L03AA02	figursabin	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom spricu	nапуњен инјекциони сприј 5 po 0,5 ml (48M/0,5ml)	Hospira Enterprises B.V.; Hospira Zagreb d.o.o.	Holandija; Republika Hrvatska	26.001,20	0,35 mg	3.791,84	-		STAC
0069130	L03AA02	figursabin	ZARZIO	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom spricu	nапуњен инјекциони сприј 1 po 0,5 ml (30 M/0,5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	3.652,90	0,35 mg	4.261,72	-		STAC
0069131	L03AA02	figursabin	ZARZIO	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom spricu	nапуњен инјекциони сприј 1 po 0,5 ml (48 M/0,5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	5.200,20	0,35 mg	3.791,81	-		STAC
0010221	L04AA04	anti-human T limfocitni imunoglobulin konicna	GRAFALON	koncentrat za rastvor za infuziju	10 po 5 ml (20 mg/ml)	Neovii Biotech GmbH	Nemacka	296.901,00	0,1 g	29.690,10	-		STAC
0010220	L04AA04	anti-human T limfocitni imunoglobulin konicna	GRAFALON	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 5 ml (20 mg/ml)	Neovii Biotech GmbH	Nemacka	29.690,10	0,1 g	29.690,10	-		STAC
0010225	L04AA04	anti-T limfocitni imunoglobulin za humanu upotrebu, zelji	THYMOGLOBULINE	prasak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 mg	Genzyme Polyclonalis S.A.S	Francuska	17.863,60	0,1 g	71.534,40	-		STAC
0014111	M04AB01	diklofenak	SANDIMMUN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampulja, 10 po 5 ml (50 mg/ml)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	10.568,10	0,25 g	1.056,81	-		STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije.
0162440	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	rastvor za injekciju	5 po 3 ml (75 mg/3 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	110,80	0,1 g	29,55	-		
0162192	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK HF	rastvor za injekciju	ampulja, 5 po 3 ml (75 mg/3 ml)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	110,80	0,1 g	29,55	-		
1162485	M01AB05	diklofenak	RAPTEN-K	oblažena tableta	blistar, 10 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	61,20	0,1 g	12,24	-		
1162487	M01AB05	diklofenak	RAPTEN DUO	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blistar, 30 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	278,00	0,1 g	12,36	-		
1162190	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK HF	gastrorezistentna tableta	blistar, 20 po 50 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	81,80	0,1 g	8,18	-		
1162193	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK FORTÉ HF	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blistar, 20 po 100 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	159,30	0,1 g	7,97	-		
1162441	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	gastrorezistentna tableta	blistar, 20 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	81,80	0,1 g	8,18	-		
1162442	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	tableta sa produljenim oslobađanjem	blistar, 20 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	159,30	0,1 g	7,97	-		
5162445	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	supozitorija	strop, 10 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	143,30	0,1 g	28,66	-		
1162403	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN DUO	tableta sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdi	blistar, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	278,00	0,1 g	12,36	-		
1162402	M01AB05	diklofenak	DILOCLOENAC-RETARD	tableta sa produljenim oslobađanjem	blistar, 20 po 100 mg	Remedica Ltd	Kipar	159,30	0,1 g	7,97	-		
1162520	M01AB15	ketorolak	ZODOL	film tableta	10 po 10 mg	Hemofarm a.d. i saradnji sa Hoffmann La Roche, Švejcarska	Republika Srbija	500,10	30 mg	15.003	-		
0162522	M01AB15	ketorolak	ZODOL	rastvor za injekciju	ampulja, 5 po 30 mg/ml	Hemofarm a.d. i saradnji sa ATHANS PHARMA UK LIMITED Velika Britanija	Republika Srbija	350,80	30 mg	70,16	-		
0162162	M01AB15	ketorolak	KETOROLAC PEYTON	rastvor za injekciju	ampulja, 5 po 1 ml (30mg/ml)	Claris Injectables Limited	Indija	269,40	30 mg	53,88	-		
1162555	M01AB16	aceclofenak	AFLAMIL	film tableta	blistar, 20 po 100 mg	Geslon Richter PLC i saradnji sa Amiral AG	Mađarska	377,00	0,2 g	37,70	-		
1161263	M01AC05	levaloksimam	XEFO RAPID	film tableta	blistar, 20 po 8 mg	Takeda GmbH	Nemacka	384,70	12 mg	28,85	-		
0161022	M01AC06	meloksikam	MOVALIS	rastvor za injekciju	ampulja, 5 po 1,5 ml (15 mg/1,5 ml)	Boehringer Ingelheim Espana S.A.	Španija	241,10	15 mg	48,22	-		
1162531	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	film tableta	blistar, 30 po 400 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	97,10	1,2 g	9,71	-		
1162512	M01AE01	ibuprofen	RAPIDOL	film tableta	blistar, 30 po 400 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	97,10	1,2 g	9,71	-		
1162513	M01AE01	ibuprofen	RAPIDOL	film tableta	blistar, 30 po 600 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	140,40	1,2 g	9,38	-		
1162423	M01AE02	naproksen	NAPROKSEN HF	film tableta	blistar, 20 po 375 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	191,90	0,5 g	12,79	-		
0162088	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	rastvor za injekciju	10 ampula po 100 mg/2 ml	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	364,50	0,15 g	54,68	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1162069	M01AE03	ketoprofen	KETONAL FORTE	film tabletta	bodica staklena, 20 po 100 mg	Lek farmaceutska društva d.d.	Slovenija	164,90	0,15 g	12,37	-		
1162220	M01AE11	isopropenska kiselina	TURGANIL	tableta	blistar, 20 po 300 mg	Union-Medic d.o.o., Novi Sad	Republika Srbija	237,00	600 mg	23,70	-		
0082320	M03AB01	suksimetonium	MIDARINE	rastvor za injekciju/infuziju	100 po 2 ml (100 mg/2 ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	4.704,30	-	-	-		STAC
0082290	M03AC04	atrakurijum beslat	TRACRIUM	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2,5 ml (25 mg/2,5 ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	634,30	-	-	-		STAC
0082291	M03AC04	atrakurijum beslat	TRACRIUM	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	1.268,40	-	-	-		STAC
0082302	M03AC04	atrakurijum-beslat	ACURMIL	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (50mg/5ml)	Biochimica Farmaceutico Lisapharma S.p.A.	Italija	1.268,40	-	-	-		STAC
0082052	M03AC09	rokuronijum bromid	ESMERON	rastvor za injekciju	10 po 5 ml (50 mg/5 ml)	N.V. Organon	Holandija	4.679,50	-	-	-		STAC
0082410	M03AC11	cisatracurijum beslat	NIMBEX	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 2,5 ml (2 mg/ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Olesloe GmbH	Italija; Nemačka	1.010,70	-	-	-		STAC
0082411	M03AC11	cisatracurijum beslat	NIMBEX	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (2 mg/ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Olesloe GmbH	Italija; Nemačka	2.024,10	-	-	-		STAC
0082111	M03AX01	toksin clostridijum botulinum tip A	DYSPORT	pršak za rastvor za injekciju	bodica 2 po 500LD50ed.	Ipsen Biopharm Limited	Velika Britanija	57.723,40	-	-	-	1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8); 2. Spasmofidna disforija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikola (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3); 3. Postepenska distonija saka, ruke i stopala (G81.8, G83.1, G83.2).	STAC
0082115	M03AX01	botulinum toksin tip A	BOTOX	pršak za rastvor za injekciju	bodice staklene, 1 po 100 j.	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	15.938,20	-	-	-	1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8); 2. Spasmofidna disforija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikola (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3); 3. Postepenska distonija saka, ruke i stopala (G81.8, G83.1, G83.2).	STAC
0085069	M05BA06	ibandronска kiselina	BONVIVA	rastvor za injekciju	najnujen injekcioni spric, 1 po 3 ml (3 mg/3 ml)	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	1.811,60	6mg	3.623,20	-	Za lečenje teških oblika esopropoz (DEVA-T) (preteći s >3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena orálnih beforfona zbog neadekvatnosti efikasne esopropoz. Nemogućnost primene orálnih beforfona potvrđuje se miđudjelom gastroenterologa. - o postojanju hroničnog gastrisa ili erozivnog gastrisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednajući ili želuca ili creva verifikovano gastroscopiskim nalazom ili - o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.	STAC: Lek se uvođi u terapiju na osnovu miđudjeljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0085068	M05BA06	ibandronска kiselina	ALVODRONIC	rastvor za injekciju u naspunjenom injekcionom spricu	1 po 3ml (3mg/3ml)	Synthor BV; Synthon Hispania SL	Holandija; Španija	1.811,60	6mg	3.623,20	-	Za lečenje teških oblika esopropoz (DEVA-T) (preteći s >3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena orálnih beforfona zbog neadekvatnosti efikasne esopropoz. Nemogućnost primene orálnih beforfona potvrđuje se miđudjelom gastroenterologa. - o postojanju hroničnog gastrisa ili erozivnog gastrisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednajući ili želuca ili creva verifikovano gastroscopiskim nalazom ili - o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.	STAC: Lek se uvođi u terapiju na osnovu miđudjeljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
9080161	N01AS03	sevofluran	SEVORANE	para za inhalaciju, tečnost	boca plastika, 1 po 250 ml (100%)	Aescle Queenbergough Ltd.; Abbott S.R.L.	Velika Britanija; Italija	15.045,20	-	-	-		STAC
0080000	N01AF03	isopental - natrijum	THIOPENTAL INJECTION BP 500 mg	pršak za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 50 po 500 mg	Rotemmedica GmbH	Nemačka	9.897,60	-	-	-		STAC
0087555	N01AH01	fentanil	FENTANYL	rastvor za injekciju	50 po 10 ml (0,05 mg/1 ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Janssen Pharmaceutica N.V.	Italija; Belgija	6.787,00	-	-	-		STAC
0087559	N01AH01	fentanil	FENTANYL PAMPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 10 ml (0,5mg/10ml)	Potekmedica GmbH; Arzneimittelwerk	Nemačka	1.357,40	-	-	-		STAC
0087575	N01AH02	fentanil	RAPIFEN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Italija; Belgija	11.361,30	-	-	-		STAC
0087171	N01AH03	sufentanil	SUFENTA forte	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)	Glaxo Smith Kline Manufacturing S.p.a.	Italija	1.333,50	-	-	-		STAC
0087621	N01AH06	remifentanil	ULTIVA	pršak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 5 po 2 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Glaxo Operations UK Limited	Italija; Velika Britanija	4.126,00	-	-	-		STAC
0087623	N01AH06	remifentanil	REMIFENTANIL B. BRAUN	pršak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 5 po 1 mg	Hameln RSD A.S.	Slovačka	1.733,10	-	-	-		STAC
0087624	N01AH06	remifentanil	REMIFENTANIL B. BRAUN	pršak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 5 po 2 mg	Hameln RSD A.S.	Slovačka	3.210,60	-	-	-		STAC
0087625	N01AH06	remifentanil	REMIFENTANIL B. BRAUN	pršak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bodica staklena, 5 po 5 mg	Hameln RSD A.S.	Slovačka	8.091,10	-	-	-		STAC
0080300	N01AX07	etomidat	HYPNOMIDATE	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 ml (2 mg/ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Janssen Pharmaceutica N.V	Italija; Belgija	567,00	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
0080420	ND1AX10	propofol	PROPOFOL 1% Fresenius		ampula, 10 po 20 ml (10 mg/ml)	Fresenius Kabi Austria GMBH	Austrija	1.204,70	-	-	-		STAC	
0080421	ND1AX10	propofol	PROPOFOL 1% Fresenius		boca staklena, 1 po 50 ml (10 mg/ml)	Fresenius Kabi Austria GMBH	Austrija	668,00	-	-	-		STAC	
0080423	ND1AX10	propofol	PROPOFOL 1% Fresenius		boca staklena, 1 po 100 ml (10 mg/ml)	Fresenius Kabi Austria GMBH	Austrija	1.181,70	-	-	-		STAC	
0080432	ND1AX10	propofol	PROPOFOL LIPIRO 1%		ampula, 5 po 20 ml (10 mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemacka	1.204,70	-	-	-		STAC	
0080431	ND1AX10	propofol	PROPOFOL LIPIRO 1%		boca staklena, 10 po 50 ml (20 mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemacka	6.680,00	-	-	-		STAC	
0080433	ND1AX10	propofol	PROPOFOL LIPIRO 2%		boca staklena, 5 po 20 ml (5 mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemacka	10.926,80	-	-	-		STAC	
0091581	ND1BB01	bupevakain	MARCAINE 0,5%	rastvor za injekciju	ampusa, 5 po 4 ml (5 mg/ml)	Recipharm Monts Cenex- Fontenay Sous Bois	Francuska	1.053,40	-	-	-		STAC	
0081562	ND1BB01	bupevakain	MARCAINE SPINAL 0,5%	rastvor za injekciju	ampusa, 5 po 4 ml (5 mg/ml)	Recipharm Monts Cenex- Fontenay Sous Bois	Francuska	2.294,50	-	-	-		STAC	
0081583	ND1BB01	bupevakain	BUPIVACAIN DELTAMEDICA	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5ml (5mg/ml)	Deltamedica GMBH	Nemacka	2.450,60	-	-	-		STAC	
0081019	ND1BB01	bupevakain	LIDOKAIN-HILORID 1%	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 3,5 ml (35 mg/3,5ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.895,00	-	-	-	Hirurška anestezija	STAC	
0081222	ND1BB02	lidokain	LIDOKAIN-HILORID 2%	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	224,20	-	-	-			
0081580	ND1BB02	lidokain	LIDOCAIN SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 ml (10mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	1.274,80	-	-	-			
0081623	ND1BB02	lidokain	LIDOCAIN SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 100 po 2 ml (20mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	491,20	-	-	-			
0081626	ND1BB02	lidokain	LIDOCAIN SOPHARMA	rastvor za injekciju										
0081011	ND1BB10	levobupevakain	CHIROCAINE	rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (5 mg/ml)	AbbVie S.R.L.	Italija	4.324,40	-	-	-		STAC	
0081540	ND1BB52	lidokain, adrenalin (epinefrin)	LIDOKAIN 2%-ADRENALIN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (40 mg+0,025 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	911,90	-	-	-			
4081716	ND1BB52	lidokain, hidroksidin	CATHJELL SA LIDOKAINOM	gel	epiklitor, 25 po 12,5g (20mg/g+0,5mg/g)	Pharmazeutische Fabrik Münchau Ges.m.b.H.	Austrija	2.678,90	-	-	-	Upotreba prilikom aplikacije katalera, endoskopa ili drugih medicinskih instrumenata u uretu.	Samo za decu	
0087854	ND2AA01	morfin	MORFIN HIDROHCLORID ALKALOID	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 20 mg/ml	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	703,40	30 mg	105,51	-			
0087018	ND2AB02	petdin hidrohlorid	DOLANTIN	rastvor za injekciju	5 po 2 ml/100 mg	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Delpharm Dijon	Nemacka; Francuska	482,30	400 mg	385,84	-		STAC	
0087531	ND2AX02	tramadol	TRODON	rastvor za injekciju	ampula, 1 po 1 ml (50 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	167,60	0,3 g	201,12	-			
0087533	ND2AX02	tramadol	TRODON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (100 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	233,30	0,3 g	139,98	-			
0086431	ND2BB02	metamizol natrijum	NOVALGETOL	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2,5 g/ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.432,70	3 g	34,38	-			
0086418	ND2BB02	metanizol natrijum	ANALEGIN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2,5 g/ml	Alkaloid a.d.	Makedonija	1.432,70	3 g	34,38	-			
0086930	ND2BE01	paracetamol	PARACETAMOL PHARMASWISS	rastvor za infuziju	boca, 10 po 100 ml (10 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Švedska	1.687,00	3 g	506,10	-			
0088333	ND2BE01	paracetamol	PARACETAMOL B.BRAUN	rastvor za infuziju	kontejner plastični, 10 po 50 ml (10mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	1.409,10	3 g	845,48	-			
0088334	ND2BE01	paracetamol	PARACETAMOL B.BRAUN	rastvor za infuziju	kontejner plastični, 100 ml (10mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	1.687,00	3 g	506,10	-			
0086656	ND2BE01	paracetamol	PARACETAMOL ACTAVIS	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 100 ml (10mg/ml)	S.M. Farmaceutici SRL	Italija	1.687,00	3 g	506,10	-			
0084520	ND3AA02	fenobarbital (fenobarbital)	PHENOBARBITON NATRIJUM	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	ampula sa razvlačenjem, 5 po 2 ml (220 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.402,50	0,1 g	129,17	-			
0085353	ND4BB01	amantadin sulfat	PK MERZ	rastvor za infuziju	10 po 500 ml (200 mg/ml)	Merz Pharma GmbH	Nemacka	11.961,80	-	-	-	U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.	STAC	
0070261	ND5AB02	fluferazin	MODITEN Depo	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (25 mg/ml)	Krka d.d.	Slovenija	1.606,80	1 mg	12,85	-		Lek se uvedi u terapiju na osnovu mitiljenja psihijatra/neuropsihijatra.	
0070207	ND5AD01	haloperidol	HALDOL DEPO	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)	Krka d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V.	Slovenija	1.913,00	3,3 mg	25,25	-		Lek se uvedi u terapiju na osnovu mitiljenja psihijatra/neuropsihijatra.	
0070200	ND5AD01	haloperidol	HALDOL	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (5 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Slovenija	325,00	8 mg	52,14	-		Lek se uvedi u terapiju na osnovu mitiljenja psihijatra/neuropsihijatra.	
0070654	ND5AE04	ziprasidon	ZELDOX	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 po 1,2 ml (20 mg/ml)	Pfizer PGM	Francuska	2.091,00	40 mg	3.465,00	-		Lek se uvedi u terapiju na osnovu mitiljenja psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.	
0070925	ND5AX05	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	pršak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bodica i rastvarač u nespremnom injekcionom špricu, 1 po 25 mg	Ciplag AG	Švajcarska	8.333,40	2,7 mg	900,01	-		Għidnejha, shizzċijski pomejci i pomejci sa sumanu (F20-F29). 1. Nelkompljanti pacienti illi koi imju nezeljnejne effekta na klasičnim deporma koj se ne mogu toleri. 2. Rezistantni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podzurumova neadekvatvan odgovor na dva klasiċha antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mitiljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070926	ND5AX05	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	pršak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bodica i rastvarač u nespremnom injekcionom špricu, 1 po 37,5 mg	Ciplag AG	Švajcarska	10.913,70	2,7 mg	778,59	-		Għidnejha, shizzċijski pomejci i pomejci sa sumanu (F20-F29). 1. Nelkompljanti pacienti illi koi imju nezeljnejne effekta na klasičnim deporma koj se no mogu toleri. 2. Rezistantni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podzurumova neadekvatvan odgovor na dva klasiċha antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mitiljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070927	ND5AX05	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	pršak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bodica i rastvarač u nespremnom injekcionom špricu, 1 po 50 mg	Ciplag AG	Švajcarska	13.298,70	2,7 mg	718,13	-		Għidnejha, shizzċijski pomejci i pomejci sa sumanu (F20-F29). 1. Nelkompljanti pacienti illi koi imju nezeljnejne effekta na klasičnim deporma koj se no mogu toleri. 2. Rezistantni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podzurumova neadekvatvan odgovor na dva klasiċha antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mitiljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0070131	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	nапуњен injekcioni sprič; 1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Bečija	18.033,50	2,5 mg	901,68	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutoču (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070132	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	nапуњен injekcioni sprič; 1 po 0,75 ml (75 mg/0,75 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Bečija	23.425,60	2,5 mg	780,85	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutoču (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070134	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	nапуњен injekcioni sprič; 1 po 1 ml (100 mg/1 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Bečija	28.820,00	2,5 mg	720,50	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutoču (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070133	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	nапуњен injekcioni sprič; 1 po 1,5 ml (150 mg/1,5 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Bečija	43.198,10	2,5 mg	719,97	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutoču (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070135	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	nапуњен injekcioni sprič; 1 po 0,875 ml (175 mg/0,875ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Bečija	53.963,40	2,5 mg	771,19	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutoču (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesечne injekcije (F20-F29).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070136	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	nапуњен injekcioni sprič; 1 po 1,315 ml (265 mg/1,315ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Bečija	70.156,10	2,5 mg	606,68	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutoču (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesечne injekcije (F20-F29).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070137	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	nапуњен injekcioni sprič; 1 po 1,75 ml (350mg/1,750ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Bečija	86.341,80	2,5 mg	616,73	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutoču (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesечne injekcije (F20-F29).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070138	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	nапуњен injekcioni sprič; 1 po 2,625 ml (525 mg/2,625ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Bečija	129.477,30	2,5 mg	616,56	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutoču (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesечne injekcije (F20-F29).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0071123	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	rstvor za injekciju infuziju	ampula, 10 po 2 ml (10 mg/2 ml)	Galentex a.d.	Republika Srpska	287,90	10 mg	28,79	-	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	STAC
0071634	N05CD08	midažolan	DORMICUM	rstvor za injekciju	ampula, 10 po 5 mg/5 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Srpskočka	548,30	15 mg	164,49	-		STAC
0071835	N05CD08	midažolan	DORMICUM	rstvor za injekciju	5 po 15 mg/3 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Srpskočka	732,00	15 mg	146,40	-		STAC
0071838	N05CD08	midažolan	PANPHARMA	rstvor za injekciju	ampula, 10 po 5ml (5mg/5ml)	Rotermedica GmbH Arzneimittelwerk	Nemačka	699,90	15mg	209,97	-		STAC
0071639	N05CD08	midažolan	PANPHARMA	rstvor za injekciju	ampula, 10 po 3ml (15mg/3ml)	Rotermedica GmbH Arzneimittelwerk	Nemačka	1.464,00	15mg	146,40	-		STAC
0089000	N06BC01	kofein	PEYONA	rstvor za infuziju i oralni rstvor	ampula, 10 po 1ml (20mg/ml)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	24.245,60	0,4g	96.962,40	-	Terapija apnee kod prevremeno rođene novorođenčadi (P07.0; P07.1; P07.3).	
0088605	N07AA01	neostigmin metilsušufat	NEOSTIGMINE COOPER	rstvor za injekciju	ampula, 50 po 1 ml (2,5 mg/ml)	Cooper S.A.	Crnica	3.653,90	2 mg	58,48	-		STAC
0088607	N07AA01	neostigmin metilsušufat	NEOSTIGMINE COOPER	rstvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (2,5mg/ml)	Cooper S.A.	Crnica	730,80	2 mg	58,48	-		STAC
2087506	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralni rstvor	bobička, 1 po 100 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	899,70	25 mg	22,49	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11). 2. Suzbijanje snažnog bola (bolja uzrokovanih karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili terciјarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi kao simptomatska terapija bola u službi kucnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciјarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi kao simptomatska terapija bola u službi kucnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciјarnom nivou.
2087507	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralni rstvor	bobička, 1 po 1000 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	5.001,90	25 mg	12,50	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11). 2. Suzbijanje snažnog bola (bolja uzrokovanih karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili terciјarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi kao simptomatska terapija bola u službi kucnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciјarnom nivou.
2087516	N07BC02	metadon	METADON MOLTENI	oralni rstvor	bobička plastična, 1 po 1000 ml (5 mg/ml)	L. Molteni & C. Del F. LLI Altri Società Di Esercizio S.P.A.	Italija	5.264,90	25 mg	26,42	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11). 2. Suzbijanje snažnog bola (bolja uzrokovanih karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili terciјarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi kao simptomatska terapija bola u službi kucnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciјarnom nivou.
2087501	N07BC02	metadon	METADON KRKA	oralni rstvor	1 po 1000ml (10mg/ml)	Krka, tovarni zdravil d.d.	Slovenija	5.001,90	25mg	12,50	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11). 2. Suzbijanje snažnog bola (bolja uzrokovanih karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili terciјarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi kao simptomatska terapija bola u službi kucnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciјarnom nivou.
0058334	R06AC03	kloropramin	SYNOOPEN	rstvor za injekciju	ampula,10 po 20 mg/2 ml	Piiva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbH	Hrvatska	836,10	20 mg	83,61	-		
0119150	R07AA02	poraktant alfa	CUROSURF	suspenzija za endotrheopulmonalnu i ukapavajuću	bobička staklena, 2 po 1,5 ml (120 mg/1,5 ml)	Chiesi Farmaceutici S.P.A.; Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Italija; Austrira	92.252,30	0,16 g	61.501,53	-		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove
0119157	R07AA02	fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfaktant)	ALVEOFACT	praski i rastvarač za suspenziju za endotrheopulmonalnu i ukapavajuću	bobička sa pršljenom i nispunjivim injekcionim spričem sa rastvaračem, 1 po 2,4 ml (45mg/ml)	Lyonark Pharma GmbH	Nemačka	24.858,80	160 mg	73.053,41	-		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove
0119158	R07AA02	fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfaktant)	ALVEOFACT	praski i rastvarač za suspenziju za endotrheopulmonalnu i ukapavajuću	bobička sa pršljenom i nispunjivim injekcionim spričem sa rastvaračem, 1 po 2,4 ml (45mg/ml)	Lyonark Pharma GmbH	Nemačka	46.579,20	160 mg	71.959,19	-		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
0180330	V03AB14	prostan-inulfat	PROTAMIN SULFAT	rstvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (0,5 mg/ml)	Ophattività a.d.	Republika Srpska	1.271,00	-	-	-		STAC
0189100	V03AB25	flumazonil	ANEXATE	rstvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (0,5 mg/ml)	Cheplapharm Azneintretit GmbH	Nemačka	3.183,40	-	-	-		STAC
0189101	V03AB25	flumazonil	ANEXATE	rstvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 10 ml (1 mg/ml)	Cheplapharm Azneintretit GmbH	Nemačka	7.068,10	-	-	-		STAC
0189102	V03AB25	flumazonil	FLUMAZENIL B BRAUN	rstvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 10 ml (0,1mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	3.163,40	-	-	-		STAC
0189103	V03AB25	flumazonil	FLUMAZENIL B BRAUN	rstvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 10 ml (0,1mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	7.068,10	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Družava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0189011	V03AB35	sugamadeks	BRIDION	rastvor za injekciju	bocica staklena, 10 po 2 ml (100mg/ml)	N.V. Organon	Holandija	63.004,20	-	-	-	Reverzija neuromuskularne blokade, selektivni blokator rokuronijum-bromida (T48.1; T88.4).	Samo za decu
1189121	V03AC03	defosfato roks	EXJADE	tableta za oralnu suspenziju	blistor, 20 po 250mg	Novartis Pharma Stein AG	Svajcarska	40.564,30	-	-	-	Terapija hroničnog preopterećenja grožđem koje je nastalo kao posledica čestih transfuzija krvi (≥7ml/kg/mesec koncentričnih eritrocita) kod pacijenta sa beteta falešnjom major, kao i za terapiju hroničnog preopterećenja grožđem koje je nastalo kao posledica transfuzija krvi kada je terapija defosfatom nesnimom kontraindikovana ili neodgovarajuća	Samo za decu. Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi hematologije zdravstveno ustavovo na temelju nivou zdravstveno zaštite.
0184027	V03AF03	kalcijum flunit	LEUCOVORIN Kalcijum	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 50 mg/5 ml	Pfizer (Perth) PTY. Ltd	Australija	2.516,50	60 mg	301,96	-		STAC
0012070	V04CF01	presečeni proteinasti derivat Nukleinske kiseline za humanu upotrebu	PPD-T TUBERKULIN	rastvor za injekciju	10 po 2,5 ml (3 i.j./0,1ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Crnac"	Republika Srbija	21.230,30	-	-	-		
0176042	V07AB..	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE	rastvor za parenteralnu upotrebu	ampula, 50 po 5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	710,90	-	-	-		
0176000	V07AB..	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE B BRAUN	rastvor za parenteralnu upotrebu	boca plastična, 20 po 100ml	B.Braun Melsungen AG. B.Braun Medical SA	Nemacka, Španija	1.477,50	-	-	-		
0176001	V07AB..	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE B BRAUN	rastvor za parenteralnu upotrebu	boca plastična, 10 po 250 ml	B.Braun Melsungen AG. B.Braun Medical SA	Nemacka, Španija	779,70	-	-	-		
0176002	V07AB..	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE B BRAUN	rastvor za parenteralnu upotrebu	boca plastična, 10 po 500ml	B.Braun Melsungen AG. B.Braun Medical SA	Nemacka, Španija	934,50	-	-	-		
0199210	V08AB02	joheksol	OMNIPACQUE	rastvor za injekciju	10 po 50 ml (300 mg/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	14.815,90	-	-	-		STAC
0199211	V08AB02	joheksol	OMNIPACQUE	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 100 ml (300 mg/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	32.391,60	-	-	-		STAC
0199214	V08AB02	joheksol	OMNIPACQUE	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 50 ml (350 mg/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	15.338,20	-	-	-		STAC
0199215	V08AB02	joheksol	OMNIPACQUE	rastvor za injekciju	10 po 100 ml (350 mg/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	30.676,50	-	-	-		STAC
0199217	V08AB02	joheksol	OMNIPACQUE	rastvor za injekciju	10 po 200 ml (350 mg/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	56.267,60	-	-	-		STAC
0199218	V08AB02	joheksol	OMNIPACQUE	rastvor za injekciju	boca plastična, 6 po 500 ml (350 mg/ml)	GE Healthcare Ireland Limited	Irska	90.563,90	-	-	-		STAC
0194292	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 300	rastvor za infuziju	bocica staklena, 10 po 50 ml (623,4 mg/ml)	Nemacka, Slovenija	18.496,50	-	-	-	-		STAC
0194293	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 300	rastvor za infuziju	bocica staklena, 10 po 100 ml (623,4 mg/ml)	Nemacka, Slovenija	34.119,00	-	-	-	-		STAC
0194255	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	bocica staklena, 10 po 50 ml (768,88 mg/ml)	Nemacka, Slovenija	21.035,30	-	-	-	-		STAC
0194256	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	bocica staklena, 10 po 100 ml (768,88 mg/ml)	Nemacka, Slovenija	42.069,70	-	-	-	-		STAC
0194257	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 200 ml (768,88 mg/ml)	Nemacka, Slovenija	84.073,00	-	-	-	-		STAC
0194259	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	boca staklena, 8 po 500 ml (768,88 mg/ml)	Nemacka, Slovenija	168.088,30	-	-	-	-		STAC
0199406	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 50 ml sa 300 mg jodatima (33,6%)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	14.865,20	-	-	-		STAC
0199411	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 75 ml (300 mg jodatima)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	22.241,80	-	-	-		STAC
0199413	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 100 ml (300mg jodatima)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	29.655,70	-	-	-		STAC
0199412	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 150 ml (300 mg jodatima)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	44.483,60	-	-	-		STAC
0199415	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 200 ml (300 mg jodatima)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	59.311,50	-	-	-		STAC
0199416	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 5 po 500 ml (300 mg jodatima)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	63.274,80	-	-	-		STAC
0199407	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 50 ml sa 350 mg jodatima (74,1%)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	17.078,10	-	-	-		STAC
0199408	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 100 ml (350 mg jodatima)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	33.302,20	-	-	-		STAC
0199409	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 200 ml (350 mg jodatima)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	54.049,60	-	-	-		STAC
0199410	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 5 po 500 ml (350 mg jodatima)	Liebel-Flarsheim Canada INC.	Kanada	63.274,80	-	-	-		STAC
0199463	V08AB09	ediksanol	VISIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 50 ml (320 mg/lmL)	GE Healthcare AS	Norveška	20.859,60	-	-	-		
0199464	V08AB09	ediksanol	VISIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 100 ml (320 mg/lmL)	GE Healthcare AS	Norveška	41.572,10	-	-	-		
0199477	V08AB10	jomepol	IOMERON 300	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (300mg/lmL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	2.870,90	-	-	-		STAC
0199479	V08AB10	jomepol	IOMERON 300	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (300mg/lmL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	5.345,80	-	-	-		STAC
0199471	V08AB10	jomepol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (400mg/lmL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	3.068,90	-	-	-		STAC
0199473	V08AB10	jomepol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (350mg/lmL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	5.939,80	-	-	-		STAC
0199472	V08AB10	jomepol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (350mg/lmL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	15.344,40	-	-	-		STAC
0199466	V08AB10	jomepol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (400mg/lmL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	4.058,80	-	-	-		STAC
0199468	V08AB10	jomepol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (400mg/lmL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	8.117,70	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0199457	V08A10	jomepol	IONERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 500 ml (400mg /ml)	Patheon Italia S.p.A.	Italija	18.766,80	-	-	-		STAC
3192101	V08B402	barijum sulfat	BARIJUM SULFAT	oralna/tekstilna suspenzija	kontejner plastični, 1 po 5 l (1 g/ml)	Hemofarm d.o.o.	Republika Srbija	7.314,50	-	-	-		
0199430	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGIST	rastvor za injekciju	bodica staklena, 10 po 20 ml (0,5mmol/ml)	Bayer Pharma AG	Nemačka	23.881,00	-	-	-		STAC
					bodica staklena, 1 po 5 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	785,90	-	-	-		STAC
0199015	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 5 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	7.855,80	-	-	-		STAC
0199021	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 10 po 5 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	1.571,70	-	-	-		STAC
0199011	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 10 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	15.716,70	-	-	-		STAC
0199017	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 10 po 10 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	2.356,90	-	-	-		STAC
0199018	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 10 po 15 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	23.568,60	-	-	-		STAC
0199013	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 20 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	2.388,10	-	-	-		STAC
0199019	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 20 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	23.881,00	-	-	-		STAC
0199014	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 30 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	3.583,00	-	-	-		STAC
0199020	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 10 po 30 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	35.830,00	-	-	-		STAC
0199010	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 100 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	9.647,70	-	-	-		STAC
0199016	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bodica staklena, 10 po 100 ml (500 mmol/ml)	Birkanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	96.477,00	-	-	-		STAC
0199422	V08CA03	gadodiamid	OMNISCAN	rastvor za injekciju	0,5 mmol/ml (257mg/ml) bodica, 10 po 20 ml	GE Healthcare Ireland; GE Healthcare AG	Irska; Norveška	23.647,80	-	-	-		STAC
0199491	V08CA05	gadobenska kiselina	MULTIHANCE	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 10 ml (52,9 mg/ml)	Patheon Italia S.p.A.	Italija	3.167,90	-	-	-		STAC
0199490	V08CA05	gadobenska kiselina	MULTIHANCE	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 15 ml (52,9 mg/ml)	Patheon Italia S.p.A.	Italija	4.751,80	-	-	-		STAC
0199492	V08CA05	gadobenska kiselina	MULTIHANCE	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 20 ml (52,9 mg/ml)	Patheon Italia S.p.A.	Italija	6.204,50	-	-	-		STAC
0199486	V08CA09	gadolutrol	GADOVIST	rastvor za injekciju	bodica staklena, 10 po 30 ml (1mmol/ml)	Bayer Pharma AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	219.152,80	-	-	-		STAC
0199487	V08CA09	gadolutrol	GADOVIST	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcijskom sprici	nапуњен injekcijski spric, 5 po 7,5 ml (1 mmol/ml)	Bayer Pharma AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	28.458,40	-	-	-		STAC
0199535	V08CA10	gadoksetinska kiselina	PRIMOVIST	rastvor za injekciju	nапуњen injekcijski spric, 1 po 10 ml (181,43 mg/ml)	Bayer Pharma AG; Bayer farmaceutska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	19.443,30	-	-	-		STAC