

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА –ЗАЈЕЧАР
РАСАДНИЧКА бб, 19000 Зајечар
Тел.019/44 35 21

УПУТСТВО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

МЕТОДА:

ПЛАНАРНА СЦИНТИГРАФИЈА ЈЕТРЕ И СЛЕЗИНЕ $^{99m}\text{Tc-Sn}$ -КОЛОИД

Метода служи за морфо-функционално испитивање RES-а јетре и слезине.

Ако сте трудни или у то сумњате-обавестите лекара.

Потребно је са собом понети комплетну медицинску документацију.

Испитивање се изводи у току једног дана, посебна припрема није потребна, можете доручковати и попити Ваше лекове.

Пре испитивања ћете у вену на руци добити малу количину радиоактивности,

Технецијум ^{99m}Tc - која је везана за колоид обележен калајем.

Снимање се изводи након 20-так минута, Гама камером у лежећем положају са задње и предње стране и у десном бочном положају, а по потреби се врши и томографско – SPECT-снимање.

У времену чекања до снимања, пацијент треба да буде у соби за апликацију радиоактивности

Медицински радик ће Вас обавестити када је снимање завршено и када ћете добити Ваш налаз